

**FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE
MEDICINALE OMEOPATICO
SENZA INDICAZIONI TERAPEUTICHE APPROVATE**

**ATODEXINE
GOCCE PER MUCOSA ORALE**

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale omeopatico perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio e come il medico o il farmacista le hanno detto di fare.

- . Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- . Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al medico o al farmacista.
- . Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, inclusi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è ATODEXINE
2. Cosa deve sapere prima di prendere ATODEXINE
3. Come prendere ATODEXINE
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare ATODEXINE
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1 . Cos'è ATODEXINE

ATODEXINE è un MEDICINALE OMEOPATICO senza indicazioni terapeutiche approvate.

ATODEXINE è una soluzione in gocce per mucosa orale.

Consultare un medico se i sintomi persistono.

2 . Cosa deve sapere prima di prendere ATODEXINE

Non prenda ATODEXINE se è allergico ad uno qualsiasi dei componenti di questo medicinale.

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere ATODEXINE.

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Questo medicinale contiene 30 vol % di etanolo (alcol).

0,15 mL di prodotto equivalgono a 5 gocce (0,15 mL = 5 gocce) e contengono 35,4 mg di etanolo.

Questo medicinale contiene 236,8 mg di alcol (etanolo) in ogni mL. La quantità in 1 mL di questo medicinale è equivalente a 6 mL di birra o 2,4 mL di vino.

L'alcol contenuto in questo medicinale omeopatico potrebbe avere influenza sui bambini. Questi effetti possono includere il sentirsi assonnati e sbalzi di umore.

Può anche alterare la capacità di concentrazione e di fare attività fisica. La quantità di alcol in questo medicinale può alterare la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

Questo perchè l'alcol può alterare la capacità di giudizio e quanto velocemente si reagisce agli stimoli. Se è affetto da epilessia o ha problemi di fegato, parli con il medico o il farmacista prima di assumere questo medicinale. L'alcol in questo medicinale può alterare gli effetti di altri medicinali. Parli con il medico o il farmacista se sta assumendo altri medicinali. Se è incinta o sta allattando al seno, parli con il medico o il farmacista prima di assumere questo medicinale. Se ha una dipendenza da alcol, parli con il medico prima di assumere questo medicinale.

3 . Come prendere ATODEXINE

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Per mucosa orale: lasciare assorbire le gocce da assumere nel cavo orale.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4 . Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5 . Come conservare ATODEXINE

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non utilizzi il prodotto dopo 12 mesi dalla prima apertura del flacone.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6 . Contenuto della confezione e altre informazioni

ATODEXINE

50 mL di soluzione contengono: CORTISONE ACETATO 18 CH 0,5 mL , PULSATILLA 6 CH 0,5 mL , SULFUR 8 CH 0,5 mL

Gli altri componenti sono: etanolo 96% e acqua depurata.

Confezione contenente 1 flacone contagocce in vetro da 50 mL.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e Produttore:

O.T.I. S.r.l. Officine Terapie Innovative

Via Tiburtina Valeria km. 69,300

67061 Carsoli (AQ)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: 27-12-2021