

HIRUDOID 25.000 U.I. Gel

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

HIRUDOID 25.000 U.I. Gel

Glicosaminoglicanopolisolfato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è HIRUDOID e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare HIRUDOID
3. Come usare HIRUDOID
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare HIRUDOID
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è HIRUDOID e a cosa serve

HIRUDOID contiene il principio attivo glicosaminoglicanopolisolfato, dotato di attività antinfiammatoria e antitrombotica, ovvero che impedisce la formazione di coaguli di sangue (trombi).

HIRUDOID è usato per trattare:

- l'infiammazione di una vena che si trova sotto la superficie della pelle (flebite superficiale) o un coagulo di sangue che causa l'infiammazione di una vena (tromboflebite);
- l'infiammazione causata dalla dilatazione di una vena (varicosi);
- gli ematomi.

2. Cosa deve sapere prima di usare HIRUDOID

Non usi HIRUDOID

- se è allergico al principio attivo, ad un eparinoide (medicinale con azione anticoagulante simile a quella dell'eparina) o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare HIRUDOID.

HIRUDOID 25.000 U.I. Gel

Interrompa il trattamento e contatti immediatamente il medico se si verificano reazioni allergiche dopo l'applicazione del gel.

Altri medicinali e HIRUDOID

Non sono note interazioni di HIRUDOID con altri medicinali.

Informi comunque il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

HIRUDOID non compromette la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

HIRUDOID contiene propilene glicole (E1520)

Questo medicinale contiene 5 mg di propilene glicole per g di gel.

3. Come usare HIRUDOID

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Se l'infiammazione non è particolarmente estesa la dose raccomandata è 5-10 cm di gel più volte al giorno.

Se l'infiammazione è estesa si possono utilizzare maggiori quantità di gel per 3-4 giorni, dopodiché la dose deve essere dimezzata e il trattamento continuato fino alla scomparsa dei sintomi.

Modo d'uso:

- Massaggi leggermente vicino la zona infiammata, evitando la parte malata.
- Non applichi il gel su ferite aperte o sulle mucose.
- Non ingerire.

Se usa più HIRUDOID di quanto deve

Se usa accidentalmente una dose eccessiva di HIRUDOID, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Non sono stati segnalati effetti indesiderati in seguito all'uso di HIRUDOID.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

HIRUDOID 25.000 U.I. Gel

5. Come conservare HIRUDOID

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene HIRUDOID

- Il principio attivo è glicosaminoglicanopolisolfato. 100 g di gel contengono 0,3 g (pari a 25.000 U.I.) di principio attivo.
- Gli altri componenti sono isopropanolo, acido poliacrilico, propilene glicole (E1520), sodio idrossido, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di HIRUDOID e contenuto della confezione

Gel per uso cutaneo trasparente e incolore e con odore caratteristico.

HIRUDOID è disponibile in confezioni da 40 g di gel in tubo di alluminio.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

EG S.p.A., Via Pavia, 6 – 20136 Milano

Produttore

Mobilat Produktions GmbH - Pfaffenhofen (Germania)

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel (Germania)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 18 Marzo 2021