

Coryfin[®] C

al mentolo ed essenza di limone,
con Vitamina C

Composizione

Una caramella contiene:

principi attivi - mentolo etilglicolato (Coryfin) 2,8 mg, sodio ascorbato 16,8 mg pari a 15 mg di acido ascorbico (Vitamina C)

eccipienti, coadiuvanti e aromatizzanti - mentolo, acido citrico, essenza di limone, saccarosio, glucosio.

Forma farmaceutica / confezione

Scatola da 24 caramelle.

Categoria farmacoterapeutica

Preparato contro la tosse e la raucedine.

Titolare AIC

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. - Via Cavour, 70 – 27035 Mede (PV)

Produttore

Sofar SpA - Via Firenze, 40 - Trezzano Rosa (MI).

Controllato da: Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. - Via Cavour, 70 – 27035 Mede (PV)

Indicazioni

Sintomatico nel trattamento della tosse e della raucedine.

Coryfin C al mentolo ed essenza di limone allevia l'irritazione locale e riduce il catarro, anche nei fumatori.

Controindicazioni

Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Bambini fino a 30 mesi di età.

Bambini con una storia di epilessia o convulsioni febbrili.

Precauzioni d'impiego

Quando la tosse o la raucedine si protraggono dopo alcuni giorni di cura, occorre consultare il medico.

Questo prodotto contiene derivati terpenici che, in dosi eccessive, possono provocare disturbi neurologici come convulsioni in neonati e bambini.

Il trattamento non deve essere prolungato per più di 3 giorni per i rischi associati all'accumulo di derivati terpenici, quali ad esempio canfora, cineolo, niaouli, timo selvatico, terpineolo, terpina, citrale, mentolo e oli essenziali di aghi di pino, eucalipto e trementina (a causa delle loro proprietà lipofile non è nota la velocità di metabolismo e smaltimento) nei tessuti e nel cervello, in particolare disturbi neuropsicologici.

Non deve essere utilizzata una dose superiore a quella raccomandata per evitare un maggior rischio di reazioni avverse al medicinale e i disturbi associati al sovradosaggio (vedere paragrafo sovradosaggio).

Il prodotto è infiammabile, non deve essere avvicinato a fiamme.

Gravidanza

Non vi sono o sono disponibili in numero limitato i dati relativi all'uso di mentolo in donne in gravidanza.

Coryfin non è raccomandato durante la gravidanza e in donne in età fertile che non usano misure contraccettive.

Allattamento

Vi sono informazioni insufficienti sull'escrezione di mentolo nel latte materno. Coryfin non deve essere utilizzato durante l'allattamento.

Interazioni con altri medicinali

Coryfin non deve essere usato in concomitanza con altri prodotti (medicinali o cosmetici) contenenti derivati terpenici, indipendentemente dalla via di somministrazione (orale, rettale, cutanea, nasale o inalatoria).

Dose, modo e tempo di somministrazione

Una caramella ogni 1 - 2 ore, fino ad un massimo di 8 caramelle al giorno.

Nei bambini sopra i 30 mesi dosi dimezzate.

Non superare le dosi indicate.

Coryfin è controindicato nei bambini fino a 30 mesi di età (vedere paragrafo controindicazioni).

La durata del trattamento non deve superare i 3 giorni.

Sovradosaggio

In caso di assunzione orale accidentale o di errata somministrazione nei neonati e nei bambini può presentarsi il rischio di disturbi neurologici.

Se necessario, somministrare un trattamento sintomatico appropriato in centri di cura specializzati.

Effetti indesiderati

Nei rari casi di effetti sensibilizzanti o irritanti, sospendere l'uso ed istituire una terapia idonea.

A causa della presenza di mentolo e in caso di non osservanza delle dosi raccomandate può presentarsi un rischio di convulsioni nei bambini e nei neonati.

Nel caso si verificano effetti indesiderati, non descritti nel presente foglietto, si consiglia di consultare il medico o il farmacista.

Data di scadenza

Attenzione: non usare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tenere il medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Ultima revisione: Luglio 2012