

FOGLIO ILLUSTRATIVO

RINGER LATTATO S.A.L.F.

soluzione per infusione endovenosa per bovini, equini, cani e gatti isotonica sterile apirogena
per USO VETERINARIO

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico Via Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (BG)

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

RINGER LATTATO S.A.L.F. soluzione per infusione endovenosa per bovini, equini, cani e gatti.

3. INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

1000 ml di soluzione contengono:

Principi attivi: Sodio cloruro 6 g - Potassio cloruro 0,4 g - Calcio cloruro biidrato 0,27 g - Sodio lattato 60% 5,46 g

Eccipienti: Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml mEq/l: Na^+ 132 - K^+ 5 - Ca^{++} 4 - Cl^- 112 - lattato come HCO_3^- 29; Osmolarità teorica: 280 mOsm/l. pH: 5,5 - 7,0

4. INDICAZIONI

Reidratante nella terapia sostitutiva parenterale delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti; alcalinizzante quando è necessario correggere stati acidotici lievi o moderati ma non gravi.

5. CONTROINDICAZIONI

Insufficienza cardiaca, condizioni associate ad iperkaliemia. Usare con cautela in caso di scompenso cardiaco congestizio, insufficienza renale grave ed in stati clinici associati ad edemi e ritenzione idrosalina.

Controindicato nelle ipercalcemie.

Non somministrare in caso di diminuita funzionalità epatica, per il rischio di sviluppo di acidosi lattica.

Non somministrare in animali con acidosi lattica grave o con alterazione dei processi ossidativi che impediscono l'utilizzazione del lattato nell'alcalosi metabolica e respiratoria.

Non somministrare in concomitanza con trasfusione di sangue, nella stessa via venosa.

6. REAZIONI AVVERSE

Nessuna nota. Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, equini, cani e gatti.

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Somministrare il prodotto per via parenterale:

- endovenosa, somministrare a funzione renale integra e ad una velocità di perfusione non superiore a 0,5 mEq potassio/Kg peso corporeo/ora;
- sottocutanea;
- endoperitoneale.

Bovini, equini: 15 ml/Kg. Cani e gatti: 20-30 ml/Kg

La dose può essere variata a giudizio del medico veterinario.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Il personale addetto alla manipolazione del prodotto deve seguire le normali precauzioni igieniche di asepsi. Evitare la contaminazione della soluzione.

10. TEMPO DI ATTESA: Carni e latte: zero giorni.

11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE
TENERE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI

In contenitori ermeticamente chiusi. Le sacche devono essere conservate a temperatura non superiore a 30°C. Non congelare. Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: dopo la perforazione del contenitore il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato; eventuali residui non possono essere riutilizzati.

12. AVVERTENZE SPECIALI

Evitare le dosi eccessive. Usare subito dopo l'apertura del contenitore. La soluzione deve essere limpida, incolore e priva di particelle visibili.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Prima di somministrare la soluzione è necessario esaminare con attenzione i dati clinici e biologici dell'animale. Il monitoraggio dei livelli sierici di elettroliti è obbligatorio nei casi di squilibri elettrolitici, quali disidratazione ipertonica o ipotonica, o nel caso di aumento di un singolo elettrolita (ad es. iperkaliemia, ipercloremia).

La soluzione contiene potassio, pertanto deve essere usata con prudenza in caso di grave compromissione renale, iperkaliemia grave e ritenzione di potassio. Un volume eccessivo di soluzione di Ringer lattato può dare origine ad edema polmonare, qualora la velocità di infusione superi il volume che può essere escreto per via renale.

Il trattamento con questo medicinale veterinario deve essere accompagnato da un monitoraggio supplementare dell'equilibrio acido-base e delle condizioni cliniche dell'animale.

Viene consigliata una "Somministrazione in vene di grosso calibro a velocità perfusionale controllata".

Questo medicinale veterinario deve essere usato con cautela in caso di insufficienza cardiaca congestizia, insufficienza renale grave e trattamento con corticosteroidi e loro derivati.

L'infusione di questa soluzione contenente ioni lattato può causare alcalosi metabolica.

Negli animali affetti da disturbi della funzione epatica, la soluzione può causare acidosi in quanto la degradazione del lattato in bicarbonato richiede un metabolismo epatico inalterato.

Usare subito dopo l'apertura del contenitore. La soluzione deve essere limpida, incolore e priva di particelle visibili. Serve per una sola ed ininterrotta somministrazione e l'eventuale residuo non può essere utilizzato.

Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Solo dopo attenta valutazione del medico veterinario responsabile del rapporto rischio/beneficio.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione

Non usare in animali in trattamento con farmaci ad azione inotropica cardiaca o con farmaci corticosteroidi.

Sovradosaggio: La somministrazione di un volume eccessivo può dare origine ad edema polmonare, qualora la velocità di perfusione superi il volume che può essere escreto per via renale. Si consiglia in questo caso, l'uso di un diuretico osmotico (esempio Mannitolo) per indurre diuresi senza ridurre il riassorbimento del sodio.

Incompatibilità: Evitare la miscelazione con farmaci a base di bicarbonati, fosfati e solfati e contetracicline. La miscelazione con altri medicinali potrebbe essere incompatibile. L'utilizzatore ha la responsabilità di verificare la compatibilità di questo medicinale con altri medicinali prima di ogni eventuale miscelazione.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Maggio 2012

Altre informazioni

Regime di dispensazione: Medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.