

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

### TIROCULAR 4% collirio, soluzione

Acetilcisteina

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di tempo.

#### Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è TIROCULAR 4% collirio e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare TIROCULAR 4% collirio
3. Come usare TIROCULAR 4% collirio
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare TIROCULAR 4% collirio
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### 1. Cos'è TIROCULAR 4% collirio e a cosa serve

TIROCULAR è indicato per il trattamento dei disturbi dell'occhio causati dalla diminuzione della secrezione lacrimale, con e senza l'alterazione delle mucose di rivestimento dell'occhio, quali: cheratocongiuntivite secca, affezioni della cornea da diminuzione della lacrimazione, cheratopatie a diversa eziologia e ulcere della cornea.

#### 2. Cosa deve sapere prima di usare TIROCULAR 4% collirio

##### Non usi TIROCULAR 4% collirio

- se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

##### Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare TIROCULAR 4% collirio.

È consigliato di non impiegare lenti a contatto morbide in corso di terapia con TIROCULAR, perché possono accumulare il conservante contenuto nella soluzione.

##### Altri medicinali e TIROCULAR 4% collirio

Non si conoscono effetti d'interazione con altri medicinali nel caso di applicazione diretta sull'occhio. Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto, o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

##### TIROCULAR 4% collirio con cibi, bevande e alcol

Non pertinente.

##### Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale. Non ci sono prove che sconsigliano l'uso di TIROCLAR durante la gravidanza e l'allattamento.

#### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

TIROCLAR non compromette la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Tuttavia eviti di usare TIROCLAR se guida un veicolo, o se usa un macchinario.

#### **TIROCLAR 4% collirio, soluzione contiene benzalconio cloruro**

Questo medicinale contiene 1,42 microgrammi di benzalconio cloruro per goccia equivalente a 0,05 mg/ml. Benzalconio cloruro può essere assorbito dalle lenti a contatto morbide e può portare al cambiamento del loro colore. Tolga le lenti a contatto prima di usare questo medicinale e aspetti 15 minuti prima di riapplicarle.

Benzalconio cloruro può anche causare irritazione agli occhi specialmente se ha l'occhio secco o disturbi alla cornea (lo strato trasparente più superficiale dell'occhio). Se prova una sensazione anomala all'occhio, di bruciore o dolore dopo aver usato questo medicinale, parli con il medico.



### **3. Come usare TIROCLAR 4% collirio**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è: 1-2 gocce all'interno dell'occhio, sollevando leggermente le palpebre, per 3-4 volte al giorno, secondo prescrizione medica.

Per somministrare

- a) rimuovere la ghiera a strappo totale
- b) rimuovere il tappo in gomma
- c) togliere dall'involucro l'apposito contagocce, e calzarlo sull'imboccatura del flacone (Fig. 1)
- d) togliere il tappo del contagocce e somministrare le gocce (Fig. 2).



#### **Uso nei bambini**

Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di TIROCLAR 4% nella popolazione pediatrica.

#### **Se usa più TIROCLAR 4% collirio di quanto deve**

Non sono previste conseguenze clinicamente significative.

#### **Se dimentica di usare TIROCLAR 4% collirio**

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Sono possibili irritazioni transitorie localizzate e in soggetti molto reattivi fenomeni di sensibilizzazione che richiedono l'interruzione del trattamento.

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare TIROCULAR 4% collirio**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Dopo l'apertura della confezione, il collirio può essere utilizzato per un periodo di tempo non superiore a tre settimane. Si raccomanda di richiudere immediatamente il flacone dopo ogni singola applicazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul flacone dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene TIROCULAR 4% collirio**

Il principio attivo è acetilcisteina. In 100 ml di soluzione sono disiolti 4 g.

Gli altri componenti sono alcool polivinilico, sodio edetato, sodio cloruro, potassio cloruro, benzalconio cloruro, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

### **Descrizione dell'aspetto di TIROCULAR 4% collirio e contenuto della confezione**

Flacone in vetro ambrato contenente 10 ml di soluzione al 4% e contagocce.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

OmniVision Italia S.r.l.  
Via Montefeltro, 6  
20156 Milano

### *Produttore*

TUBILUX PHARMA S.p.A.  
Via Costarica, 20/22  
00071 Pomezia (ROMA)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 11/2021**