

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

### **FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli** estratto acquoso di Triticum vulgare

#### **Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Cos'è FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli
3. Come usare FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Cos'è FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli e a cosa serve**

FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli contiene estratto acquoso di Triticum vulgare ed è indicato in soggetti adulti per il trattamento delle malattie flogistiche (con componente infiammatoria) e distrofiche (con piccole lesioni) di qualsiasi natura dell'apparato genitale femminile.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo il trattamento.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli**

##### **Non usi FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli**

Se è allergico al principio attivo (estratto acquoso di Triticum vulgare) o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Non utilizzi FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli nei bambini o adolescenti (vedere "Bambine e adolescenti").

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli.

Interrompa subito il trattamento se si verificano fenomeni di sensibilizzazione (eccessiva reattività verso il prodotto). L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico (locale) può dare origine a fenomeni di questo tipo.

Sospenda il trattamento anche in caso di sviluppo di germi insensibili (che non rispondono al trattamento con il farmaco).

##### **Bambine e adolescenti**

Non utilizzi FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli nelle bambine o adolescenti (vedere "Non usi FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli").

### **Altri medicinali e FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni tra FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli ed altri farmaci.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Può usare FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli se è in gravidanza o se sta allattando.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli non altera la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.

## **3. Come usare FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1 ovulo alla sera o secondo il parere del medico.

#### Modalità di applicazione:

Introdurre l'ovulo profondamente in vagina.

### **Se usa più FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli di quanto deve**

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Non sono stati segnalati effetti indesiderati.

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese e al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli**

Un ovulo da 3,5 g contiene:

*Principio attivo:* estratto acquoso di Triticum vulgare (residuo secco pari a 200 mg/100 ml) 600 mg.

*Altri componenti:* 2-fenossietanolo; macrogol 400; macrogol 1500; macrogol 12000.

### **Descrizione dell'aspetto di FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli e contenuto della confezione**

Ovuli di colore bianco omogenei.

Confezione da 6 ovuli da 3,5 g.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

FARMACEUTICI DAMOR S.p.A. Via E. Scaglione, 27 - 80145 Napoli.

### **Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il**

01 Ottobre 2022