

## **Foglio illustrativo: informazioni per il paziente**

### **Preparazione H 10,8 mg/g unguento**

Estratto di cellule di *Saccharomyces Cerevisiae*

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Preparazione H e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Preparazione H
3. Come usare Preparazione H
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Preparazione H
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è Preparazione H e a cosa serve**

Preparazione H è un medicinale antiemorroidale che contiene il principio attivo estratto di cellule di *Saccharomyces Cerevisiae*.

Preparazione H si usa per il trattamento di:

- emorroidi esterne ed interne non complicate;
- ragadi anali.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento, oppure se il disturbo si presenta ripetutamente, o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare Preparazione H**

##### **NON usi Preparazione H**

- se è allergico all'estratto di cellule di *Saccharomyces Cerevisiae* o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al farmacista prima di usare Preparazione H.

Faccia particolare attenzione e consulti il medico:

- se usa Preparazione H per un lungo periodo, perché l'impiego prolungato dei medicinali per uso locale può provocare reazioni allergiche. In questo caso interrompa il trattamento. Il medico le darà un trattamento idoneo;
- se si verifica sanguinamento;
- se il disturbo persiste.

### **Altri medicinali e Preparazione H**

Informi il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Preparazione H può essere usato in gravidanza e durante l'allattamento con latte materno.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Ad oggi non sono noti effetti negativi sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

**Preparazione H contiene metil-paraidrossibenzoato e propil-paraidrossibenzoato** che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

**Preparazione H contiene lanolina**, che può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto).

**Preparazione H contiene idrossitoluene butilato**, che può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto) o irritazione degli occhi e delle mucose.

## **3. Come usare Preparazione H**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è: 2-3 applicazioni di unguento al giorno.

- Applichi l'unguento se possibile dopo ogni evacuazione;
- prenda l'applicatore dotato di cappuccio di protezione contenuto nella confezione;
- tolga il cappuccio, lubrifichi l'applicatore e lo avviti al tubo;
- sprema il tubo di Preparazione H fino a riempire l'applicatore;
- inserisca nel retto e sprema nuovamente il tubo sino ad introdurre una sufficiente quantità di prodotto;
- applichi l'unguento anche sulla zona esterna;
- dopo l'uso, pulisca l'applicatore e lo ricopra con il cappuccio.

Non superi le dosi raccomandate senza aver prima consultato il medico.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento, oppure se il disturbo si presenta ripetutamente, o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

### **Se usa più Preparazione H di quanto deve**

Ad oggi non sono stati riportati fenomeni di sovradosaggio con l'uso di Preparazione H unguento.

### **Se dimentica di usare Preparazione H**

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

### **Se interrompe il trattamento con Preparazione H**

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

#### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Ad oggi non sono stati segnalati particolari effetti indesiderati con l'uso di Preparazione H.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse](http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse).

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

#### **5. Come conservare Preparazione H**

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Conservare nella confezione originale.

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservi sia la scatola che il foglio illustrativo.

#### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

##### **Cosa contiene Preparazione H**

- Il principio attivo è estratto di cellule di *Saccharomyces Cerevisiae*. 100 g di unguento contengono 1,08 g di estratto di cellule di *Saccharomyces Cerevisiae*.
- Gli altri componenti sono olio di fegato di pesce, vaselina bianca, olio minerale leggero, Argobase L2 (paraffina liquida, cera di lana, vaselina, lanolina anidra, ozokerite, idrossitoluene butilato (BHT)), lanolina, glicerolo, metil-p-idrossibenzoato, propil-p-idrossibenzoato, olio di timo rosso.

##### **Descrizione dell'aspetto di Preparazione H e contenuto della confezione**

Ogni confezione di preparazione H contiene un tubo di unguento per uso locale da 25 g o da 50 g.

##### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.r.l.

Via Zambeletti s.n.c.

20021 Baranzate (MI)

##### **Produttore**

Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l. – Aprilia, Italia

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il Febbraio 2021**