

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
REACTIFARGAN 2g/100g Crema
Prometazina

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è REACTIFARGAN e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare REACTIFARGAN
3. Come usare REACTIFARGAN
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare REACTIFARGAN
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è REACTIFARGAN e a cosa serve

REACTIFARGAN contiene prometazina che blocca l'istamina, una sostanza coinvolta nelle reazioni allergiche e riduce la sensibilità al dolore sul sito di applicazione.

REACTIFARGAN è indicata per il trattamento delle punture di insetto e irritazioni della pelle come rossore, bruciore, prurito ed eritema solare (irritazione della pelle dovuta a eccessiva esposizione al sole).

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare REACTIFARGAN

Non usi REACTIFARGAN:

- se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- su lesioni della pelle chiamate eczemi, caratterizzate da prurito, arrossamento e vescicole che possono rompersi con fuoriuscita di liquido;
- su lesioni della pelle che si presentano con fuoriuscita di liquido.

Non usare REACTIFARGAN nei bambini al di sotto dei 2 anni di età.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare REACTIFARGAN.

In caso di terapia prolungata REACTIFARGAN può provocare reazioni allergiche con peggioramento della condizione. In tal caso, interrompa il trattamento e si rivolga al medico o al farmacista.

REACTIFARGAN può ritardare il processo di cicatrizzazione delle ferite; se usa questo medicinale su lesioni in via di guarigione, non lo applichi per più di 3-4 giorni consecutivi.

Se applicato su aree molto estese della pelle REACTIFARGAN può causare sonnolenza (vedere Guida di veicoli e utilizzo di macchinari).

In caso di eritema solare, non esponga la pelle al sole dopo aver applicato questo medicinale.

Interrompa l'uso e contatti il medico se i sintomi persistono, peggiorano o se compaiono nuovi sintomi.

Altri medicinali e REACTIFARGAN

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni tra REACTIFARGAN ed altri medicinali.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Usare REACTIFARGAN solo in caso di effettiva necessità.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

L'applicazione abbondante di REACTIFARGAN su aree molto estese della pelle, può causare sonnolenza. Faccia particolare attenzione prima di mettersi alla guida di veicoli o di usare macchinari.

REACTIFARGAN contiene metil-para-idrossibenzoato e propile-para-idrossibenzoato

Possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

Questo medicinale contiene:

- fragranza olio di lavanda a sua volta contenente: D-Limonene, geraniolo e linalolo che possono causare reazioni allergiche;
- octil metossicinnamato a sua volta contenente idrossitoluene butilato che può causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto) o irritazione agli occhi e alle mucose.

3. Come usare REACTIFARGAN

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Applichi REACTIFARGAN sulla parte interessata, 3-4 volte al giorno. Non superare il numero raccomandato di applicazioni giornaliere.

Evitare l'applicazione su aree molto estese del corpo.

Se usa più REACTIFARGAN di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di REACTIFARGAN, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Gli effetti indesiderati sotto riportati derivano dall'esperienza post marketing e hanno frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

In corso di trattamento possono insorgere:

- dermatite (infiammazione della pelle);
- edema (gonfiore),
- rossore (eritema),
- bolle
- reazioni di sensibilità alla luce (fotosensibilità)

-Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare REACTIFARGAN

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non si utilizzano più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene REACTIFARGAN

Il principio attivo è: prometazina.

100 grammi di crema contengono: 2 grammi di prometazina.

Gli altri componenti sono: poliacrilamide isoparaffin laureth-7, octil metossicinnamato, metil-para-idrossibenzoato, propile-para-idrossibenzoato, olio composto di lavanda, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di REACTIFARGAN e contenuto della confezione

Tubo contenente 20 o 50 grammi di crema.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Johnson & Johnson S.p.A., Via Ardeatina km 23,500 - 00071 Santa Palomba – Pomezia, ROMA.

Produttore:

Delpharm Orléans, 5 avenue de Concy - 45071 ORLEANS Cedex 2, France.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 01/2023