

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

MACMIROR COMPLEX 500 mg/200.000 U.I. ovuli vaginali

Nifuratel e Nistatina

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico, o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è MACMIROR COMPLEX e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare MACMIROR COMPLEX
3. Come usare MACMIROR COMPLEX
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare MACMIROR COMPLEX
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è MACMIROR COMPLEX e a cosa serve

MACMIROR COMPLEX contiene i principi attivi nifuratel e nistatina.

Il nifuratel è un antibatterico, micostatico e tricomonocida, cioè è in grado di inibire la crescita di organismi quali batteri, funghi, lieviti e protozoi.

La nistatina è un antibiotico con azione fungicida, cioè è in grado di uccidere i funghi.

MACMIROR COMPLEX si usa **nelle donne** per il trattamento di infezioni dell'apparato genitale (vulvovaginiti) causate da microorganismi come *Candida*, *Trichomonas* e batteri.

I sintomi più facilmente riscontrabili in tali infezioni sono: perdite vaginali abbondanti e/o diverse dal solito, prurito, arrossamento, bruciore, bruciore al passaggio dell'urina, dolore durante i rapporti sessuali.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

2. Cosa deve sapere prima di usare MACMIROR COMPLEX

Non usi MACMIROR COMPLEX

- se è allergico al nifuratel e/o alla nistatina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare MACMIROR COMPLEX.

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso locale può dare origine a reazioni allergiche (vedere paragrafo "Possibili effetti indesiderati"). In tal caso interrompa il trattamento e consulti il medico che istituirà la terapia idonea.

MACMIROR COMPLEX è solo per uso locale vaginale. Non ingerisca.

Bambini

Questo medicinale non è raccomandato nelle bambine perché la sicurezza e l'efficacia non sono state dimostrate.

Altri medicinali e MACMIROR COMPLEX

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni con altri medicinali.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

MACMIROR COMPLEX 500 mg/200.000 U.I. ovuli vaginali contiene sodio etil-p-idrossibenzoato e sodio propil-p-idrossibenzoato.

Possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

3. Come usare MACMIROR COMPLEX

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1 ovulo al giorno.

Come

Inserisca l'ovulo profondamente in vagina.

Durante il trattamento si astenga dai rapporti sessuali.

Se usa più MACMIROR COMPLEX di quanto deve

Considerando la dose raccomandata e la via di somministrazione, l'uso di una dose eccessiva è improbabile.

Se dimentica di usare MACMIROR COMPLEX

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con MACMIROR COMPLEX

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di MACMIROR COMPLEX, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare MACMIROR COMPLEX

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede particolari condizioni di conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni**Cosa contiene MACMIROR COMPLEX 500 mg/200.000 U.I. ovuli vaginali**

- I principi attivi sono nifuratel e nistatina. Un ovulo contiene 500 mg di nifuratel e 200.000 U.I. di nistatina.
- Gli altri componenti sono: dimeticone, gelatina, glicerina, **sodio etil-p-idrossibenzoato (E215)**, **sodio propil-p-idrossibenzoato (E217)**, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172).

Descrizione dell'aspetto di MACMIROR COMPLEX e contenuto della confezione

Si presenta in forma di ovuli per uso ginecologico. È disponibile in confezioni da 12 ovuli.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nel paese di origine

POLICHEM SA 50 Val Fleuri, L-1526 Lussemburgo

Produttore

Doppel Farmaceutici S.r.l. – Via Volturmo, nr. 48

Quinto de Stampi – 20089 Rozzano (MI), Italia

e/o

Doppel Farmaceutici S.r.l. - Via Martiri delle Foibe, 1

29016 Cortemaggiore (PC), Italia

Importatore parallelo in Italia

Farmed S.r.l. - Via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli, Italia

Riconfezionato nell'officina indicata dall'ultima lettera accanto al numero di lotto

(A) Pharma Partners S.r.l. - Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato

(B) De Salute S.r.l. - Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR)

(D) XPO Supply Chain Pharma ITALY S.p.A. - Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 01/08/2022

Tutti i marchi e i nomi commerciali di terze parti appartengono ai rispettivi Proprietari