

TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA  
**ARTI GRAFICHE DI GENNARO**  
 VIA N. GALINO, 125 R. - GENOVAPONTEDECIMO  
 TEL. e FAX 010 7720797 - E-mail: digigraf@libero.it

DATA <b>17 APRILE 2018</b>	REV. <b>6</b>	MODELLO <b>IS0283</b>	PRODOTTO <b>LACRIMART</b>	NUMERO ORDINE <b>17685 del 11/04/18</b>	FILE Lacrimart IS0283 2018
COLORE DI STAMPA <b>NERO</b>	CARTA <b>USO MANO 60 g/mq</b>	FORMATO <b>124 x 150 mm</b>		CONFEZIONE IN TERMORETRAIBILE <b>PACCHI DA 4.000 fg.</b>	CODICE VISIVO <b>78</b>

mm. 13



**Lacrimart®**

0,01% + 0,15% COLLIRIO  
 BENZALCONIO CLORURO E METILCELLULOSA

**PRIMA DELL'USO LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO.**

Questo è un medicinale di automedicazione che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del Medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al Farmacista.
- Consultate il Medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

mm. 29

mm. 13



**COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L' ALLATTAMENTO:**  
 Lacrimart può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

**QUALI AIUMENTI O MEDICINALI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE:**  
 Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro Medico o Farmacista.

**È IMPORTANTE SAPERE CHE:**

Lacrimart non interferisce sulla capacità di guida né sull'uso di macchine.

**COME USARE QUESTO MEDICINALE:**

Attenzione: non superare le dosi consigliate.

Instillare 1-2 gocce nel sacco congiuntivale 3-4 volte al dì. Mantenere l'occhio aperto e tramite leggera pressione sul corpo del флаcone, instillare una goccia nel sacco congiuntivale. L'uso se prolungato, di prodotti per uso topico può dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il Medico per istituire una terapia idonea.

**COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DEL MEDICINALE:**

In caso di ingestione accidentale di Lacrimart, avvertite immediatamente il Medico.

**EFFETTI INDESIDERATI:**

È possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione) per altro priva di conseguenze, che non comporta modifica del trattamento. Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è opportuno consultare il Medico o il Farmacista. È opportuno comunicare al Medico o al Farmacista la comparsa di qualsiasi effetto indesiderato non descritto nel foglio illustrativo. Richiedere la scheda di segnalazione degli effetti indesiderati disponibile in Farmacia (modello B).

**SCADENZA E CONSERVAZIONE:**

La data di scadenza riportata sull'etichetta si riferisce al prodotto in confezione integro correttamente conservato. Il prodotto non deve essere utilizzato oltre i 30 giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

È importante avere a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

Revisione del foglio illustrativo da parte del Ministero della Salute: Dicembre 2005.

**BAIF**

VIA XX SETTEMBRE 20/68 • 16121 GENOVA  
 TEL 010566251 • FAX 010566252  
 WWW.BAIFINTERNATIONAL.IT  
 INFO@BAIFINTERNATIONAL.IT

IS0283  
 04/0418

18/04/2018  
 PER APPROVAZIONE

BAIF INTERNATIONAL  
 PRODUCED IN NEW YORK S.n.c

mm. 13



**Lacrimart®**

0,01% + 0,15% COLLIRIO  
 BENZALCONIO CLORURO E METILCELLULOSA

**PRIMA DELL'USO LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO.**

Questo è un medicinale di automedicazione che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del Medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al Farmacista.
- Consultate il Medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

mm. 29

mm. 13



**COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L' ALLATTAMENTO:**  
 Lacrimart può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

**QUALI AIUMENTI O MEDICINALI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE:**  
 Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro Medico o Farmacista.

**È IMPORTANTE SAPERE CHE:**

Lacrimart non interferisce sulla capacità di guida né sull'uso di macchine.

**COME USARE QUESTO MEDICINALE:**

Attenzione: non superare le dosi consigliate.

Instillare 1-2 gocce nel sacco congiuntivale 3-4 volte al dì. Mantenere l'occhio aperto e tramite leggera pressione sul corpo del флаcone, instillare una goccia nel sacco congiuntivale. L'uso se prolungato, di prodotti per uso topico può dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il Medico per istituire una terapia idonea.

**COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DEL MEDICINALE:**

In caso di ingestione accidentale di Lacrimart, avvertite immediatamente il Medico.

**EFFETTI INDESIDERATI:**

È possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione) per altro priva di conseguenze, che non comporta modifica del trattamento. Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è opportuno consultare il Medico o il Farmacista. È opportuno comunicare al Medico o al Farmacista la comparsa di qualsiasi effetto indesiderato non descritto nel foglio illustrativo. Richiedere la scheda di segnalazione degli effetti indesiderati disponibile in Farmacia (modello B).

**SCADENZA E CONSERVAZIONE:**

La data di scadenza riportata sull'etichetta si riferisce al prodotto in confezione integro correttamente conservato. Il prodotto non deve essere utilizzato oltre i 30 giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

È importante avere a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

Revisione del foglio illustrativo da parte del Ministero della Salute: Dicembre 2005.

**BAIF**

VIA XX SETTEMBRE 20/68 • 16121 GENOVA  
 TEL 010566251 • FAX 010566252  
 WWW.BAIFINTERNATIONAL.IT  
 INFO@BAIFINTERNATIONAL.IT

IS0283  
 04/0418

18/04/2018  
 PER APPROVAZIONE

BAIF INTERNATIONAL  
 PRODUCED IN NEW YORK S.n.c