

Diathynil 5 mg compresse

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Diathynil 5 mg compresse D(+) biotina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Diathynil e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Diathynil
3. Come prendere Diathynil
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Diathynil
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Diathynil e a cosa serve

Diathynil contiene il principio attivo D(+) biotina. La D(+) biotina è una vitamina del gruppo B essenziale per il metabolismo dei carboidrati, dei grassi e delle purine.

Diathynil è indicato per il trattamento di malattie della pelle che provocano eccessiva produzione di sebo o desquamazione.

Indicazioni nell'adulto:

- infiammazione della pelle caratterizzata dalla presenza di un leggero rossore, di scaglette e chiazze in varie zone del corpo (dermatite seborroica);
- acne;
- perdita di capelli di varia natura (alopecia).

Indicazioni nel bambino:

- infiammazioni localizzate della pelle:
 - dermatiti da pannolino
 - arrossamenti delle pieghe della pelle
 - crosta latte
- infiammazioni generalizzate della pelle:
 - diffuso e persistente arrossamento della pelle, spesso con desquamazione, tipico del lattante (sindrome di Leiner-Moussous detta anche eritrodermia desquamativa del lattante)
- malattie legate alla carenza di vitamine
 - infiammazione della lingua con problemi digestivi

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Diathynil

Non prenda Diathynil

- se è allergico alla D(+) biotina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Diathynil.

Diathynil 5 mg compresse

Durante il trattamento con Diathynil non deve mangiare albume d'uovo crudo, perché questo contiene una proteina chiamata avidina che si combina con il principio attivo contenuto in Diathynil rendendolo inattivo.

Altri medicinali e Diathynil

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Ad oggi, non è nota alcuna interazione di Diathynil con altri medicinali.

Gravidanza e, allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Diathynil può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Diathynil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

Diathynil contiene lattosio

Diathynil contiene lattosio, se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Diathynil contiene 5 mg di biotina per compressa. Se prevede di sottoporsi ad esami di laboratorio, deve comunicare al medico o al personale di laboratorio che assume o ha recentemente assunto Diathynil, perché la biotina può influenzare i risultati di tali esami. A seconda del test utilizzato, i risultati possono essere falsamente elevati o falsamente bassi a causa della biotina. Il medico potrebbe chiederle di interrompere l'assunzione di Diathynil prima di eseguire gli esami di laboratorio. Dovrebbe inoltre essere a conoscenza che altri prodotti che potrebbe assumere, quali complessi multivitaminici o integratori per capelli, pelle e unghie potrebbero contenere biotina e influenzare i risultati degli esami di laboratorio. Informi il medico o il personale di laboratorio se assume tali prodotti.

3. Come prendere Diathynil

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata dipende dalla malattia.

Trattamento della perdita di capelli e dell'eccessiva produzione di sebo dal cuoio capelluto

Il medico le prescriverà le compresse di Diathynil dopo un periodo iniziale di trattamento con Diathynil soluzione iniettabile.

La dose raccomandata è 3 compresse al giorno per 2 mesi.

Trattamento delle altre malattie

Uso negli adulti

La dose raccomandata è 2-4 compresse al giorno per il periodo prescritto dal medico.

Uso nei bambini

La dose raccomandata è 1-2 compresse al giorno per il periodo prescritto dal medico.

Per i bambini che vengono allattati, le compresse possono essere sciolte nel biberon.

Se prende più Diathynil di quanto deve

In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di Diathynil, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di prendere Diathynil

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Diathynil

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Sono stati riportati rarissimi casi di intolleranza con arrossamento della pelle o manifestazioni simili all'orticaria.

Diathynil 5 mg compresse

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa>
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Diathynil

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad."
La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Diathynil

- Il principio attivo è D(+) biotina. Ogni compressa contiene 5 mg di D(+) biotina.
- Gli altri componenti sono lattosio, amido di mais, talco, acido stearico, stearato di magnesio.

Descrizione dell'aspetto di Diathynil e contenuto della confezione

Ogni confezione contiene 20 o 30 compresse bianche in blister.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Alfasigma S.p.A. - Via Ragazzi del '99, n. 5 - 40133 Bologna (BO)

Produttore

CENEXI – Fontenay-sous-Bois (Francia)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato: Maggio 2019