

**Foglio illustrativo: informazioni per il paziente****Seki 3,54 mg/ml sciroppo**  
cloperastina fendizoato

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per Lei.**

**Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

**Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Seki e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Seki
3. Come prendere Seki
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Seki
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

**1. Che cos'è Seki e a cosa serve**

Seki è un medicinale che agisce come sedativo della tosse.

Seki si usa per calmare lo stimolo a tossire.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento. Si rivolga al medico se il bambino non si sente meglio o si sente peggio dopo 7 giorni.

**2. Cosa deve sapere prima di prendere Seki****Non usi Seki**

- se è allergico alla cloperastina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6),  
nei bambini al di sotto dei 2 anni.

**Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Seki.

E' consigliata cautela nell'uso se è affetto da ipertensione intraoculare, ipertrofia prostatica o ostruzione della vescica.

**Altri medicinali e Seki**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Eviti l'uso contemporaneo di Seki con:

- medicinali antistaminici (usati per il trattamento delle allergie);

- medicinali anticolinergici;
- medicinali sedativi.

Usi questo medicinale con cautela e si rivolga al medico se sta assumendo sostanze che deprimono o che stimolano il sistema nervoso centrale.

### **Seki con cibi ed alcol**

Non è raccomandata l'assunzione di Seki durante i pasti (vedere "Come prendere Seki").  
Eviti l'assunzione di bevande alcoliche durante il trattamento con Seki.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Eviti l'assunzione di Seki nei primi mesi della gravidanza; nell'ulteriore periodo, assuma questo medicinale solo in caso di effettiva necessità e solo sotto il diretto controllo del medico.

Non è noto se il medicinale e/o i suoi metaboliti siano escreti nel latte materno. Non assuma Seki durante l'allattamento.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Seki può dare sonnolenza. Presti attenzione se intende condurre veicoli o attendere ad operazioni che richiedono integrità del grado di vigilanza.

### **Seki contiene saccarosio**

Lo sciroppo contiene 1,687 g di saccarosio per dose da 3,75 ml (tacca "Bambini") e 3,375 g di saccarosio per dose da 7,5 ml (tacca "Adulti").

Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Seki contiene saccarosio. Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito o che seguono regimi dietetici poveri di calorie (ipocalorici).

### **Seki contiene Etanolo (contenuto nell'aroma banana)**

Questo medicinale contiene 0,0011 ml di alcol (etanolo) in ogni dose da 3,75 ml (tacca "Bambini") e 0,0022 ml di alcol (etanolo) in ogni dose da 7,5 ml (tacca "Adulti").

La quantità in una dose di questo medicinale è equivalente a meno di 1 ml di birra o 1 di vino.

La piccola quantità di alcol in questo medicinale non produrrà effetti rilevanti.

### **Seki contiene Propilene Glicole (contenuto nell'aroma banana)**

Questo medicinale contiene 8,6 mg di propilene glicole in 3,75 ml (tacca "Bambini") e 17,3 mg di propilene glicole in 7,5 ml (tacca "Adulti").

### **Seki contiene Sodio (contenuto nella carmellosa sodica)**

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23mg) di sodio per dose, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

### **Seki contiene paraidrossibenzoati (parabeni)**

Lo sciroppo contiene metil-para-idrossibenzoato e propil-para-idrossibenzoato (E218 ed E216) che possono provocare reazioni allergiche (anche ritardate).

## **3. Come prendere Seki**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

**Le dosi raccomandate sono:**

**Adulti**

**Seki 3,54mg/ml sciroppo**

2 bicchierini la sera al momento di coricarsi, 1 bicchierino il mattino ed 1 bicchierino il pomeriggio (riempia il bicchierino incluso nella confezione fino al raggiungimento della tacca “Adulti”; una tacca “Adulti” corrisponde a 7,5 ml di sciroppo).

**Uso nei bambini**

**Seki 3,54mg/ml sciroppo**

- **bambini dopo i 2 anni:** 2 bicchierini la sera prima di coricarsi, 1 bicchierino il mattino ed 1 bicchierino il pomeriggio (riempia il bicchierino incluso nella confezione fino al raggiungimento della tacca “Bambini”; una tacca “Bambini” corrisponde a 3,75 ml di sciroppo).

Non è raccomandata l’assunzione del medicinale durante i pasti.

**Istruzioni per l’apertura del flacone**

1. Prema sulla capsula e sviti nel senso indicato dalla freccia (vedi fig. 1).
2. Per richiudere il flacone, avviti a fondo in senso contrario all’apertura (vedi fig. 2).



**Se prende più Seki di quanto deve**

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Seki avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

**Se dimentica di prendere Seki**

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

**4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

**Non comuni** (possono interessare fino a 1 su 100 pazienti)

- sonnolenza,
- bocca secca.

**Frequenza non nota** (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- gravi reazioni allergiche a rapida comparsa (reazione anafilattica/anafilattoide),
- orticaria,
- arrossamento cutaneo (eritema).

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### **5. Come conservare Seki**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Conservi lo sciroppo a temperatura inferiore a 30°C.

Il flacone, dopo prima apertura, è utilizzabile per un periodo non superiore ai 30 giorni.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

#### **Cosa contiene Seki**

#### **Seki 3,54 mg/ml sciroppo**

- Il principio attivo è cloperastina fendizoato. 100 ml contengono 354 mg di cloperastina fendizoato pari a 180 mg di cloperastina.
- Gli altri componenti sono: cellulosa microcristallina, carmellosa sodica, poliossil-40-stearato, **saccarosio, metil-para-idrossibenzoato, propil-para-idrossibenzoato**, essenza banana (contenente **etanolo e propilene glicole**), acqua depurata.

#### **Descrizione dell'aspetto di Seki e contenuto della confezione**

Seki si presenta sotto forma di:

*Sciroppo* - flacone da 200 ml

#### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

Zambon Italia s.r.l.

Via Lillo del Duca 10 – 20091 Bresso (MI)

#### **Produttore**

Zambon S.p.A. - Vicenza

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 28 ottobre 2021**