Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Diclomed 0,3 mg/spruzzo, spray per mucosa orale
Diclofenac

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al medico o al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 3 giorni di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Diclomed e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Diclomed
3. Come usare Diclomed
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Diclomed
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Diclomed e a cosa serve

Diclomed è un preparato stomatologico per uso locale a base di diclofenac.
Questo medicinale è indicato nel trattamento dei sintomi di irritazione e infiammazione che comportano dolore a livello di bocca o gola, ad esempio infiammazioni delle gengive, della mucosa orale o della faringe (gengiviti, stomatiti, faringiti).
Diclomed può essere utilizzato anche quando questi sintomi sono conseguenti alla terapia dentaria per la cura o l'estrazione di denti.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 3 giorni di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare Diclomed

Non usi Diclomed
- se è allergico al diclofenac o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se è allergico all'acido acetilsalicilico (aspirina) o ad altri medicinali simili (farmaci antinfiammatori non steroidei).
- Se è negli ultimi 3 mesi di gravidanza.

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Diclomed.

L'uso, specie se prolungato, dei preparati per uso locale può dare luogo a fenomeni di tipo allergico. Se ciò dovesse accadere, interrompa il trattamento con Diclomed e si rivolga al medico per istituire, se necessario, una terapia adatta.

Atri medicinali e Diclomed
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.
Non sono state segnalate interazioni negative con altri medicinali.

Gravidanza, allattamento e fertilità
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prenderequesto medicinale.
Non usi Diclomed se è negli ultimi 3 mesi di gravidanza. Non usi Diclomed durante i primi 6 mesi di gravidanza se non strettamente necessario e su indicazione del medico. In caso di necessità di trattamento durante tale periodo, deve essere usata la dose più bassa per il tempo più breve possibile.
Le forme orali (ad es. compresse) di diclofenac possono causare effetti avversi nel nascituro. Non è noto se lo stesso rischio si presenti con diclofenac quando viene utilizzato in bocca.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non sono noti effetti negativi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.

Diclomed contiene sodio benzoato (E211)
Sodio benzoato (E211) può causare irritazione locale. Diclomed 0,3 mg/spruzzo, spray per mucosa orale contiene 150 mg di sodio benzoato (E211) in 15 ml, equivalenti a 10 mg/ml.

3. Come usare Diclomed

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 2 spruzzi tre volte al giorno, indirizzati direttamente sulla parte interessata.

Se usa più Diclomed di quanto deve
Non sono stati riportati casi di sovradosaggio con Diclomed.
In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di Diclomed avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di usare Diclomed
Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose precedente.

Se interrompe il trattamento con Diclomed
Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Diclomed 0,3 mg/spruzzo spray è generalmente ben tollerato e raramente si manifestano effetti indesiderati.

- Effetti indesiderati di entità lieve:

- nausea
- abbassamento della pressione del sangue
- brividi
- alterazioni della visione
- cattiva digestione

- Effetti indesiderati di entità moderata:
  - mal di testa
  - alterazioni delle membrane mucose

- Altri effetti indesiderati:
  - sensazione di bruciore alla bocca (frequenza non nota)

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse
Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Diclomed

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro correttamente conservato.

Attenzione: Non usi il medicinale dopo 1 anno dalla prima apertura del contenitore multidose.

Conservi a temperatura non superiore ai 25°C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Diclomed
- Il principio attivo è diclofenac acido. Uno spruzzo (corrispondente a 0,2 ml) contiene 0,3 mg di diclofenac acido.
- Gli altri componenti sono: sorbitolo, colina cloruro, sodio edetato, sodio benzoato (E211), acesulfame potassico, olio essenziale di menta, pesca aroma naturale, allura red (E129), etanolo, sodio idrossido, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Diclomed e contenuto della confezione
Diclomed si presenta sotto forma di spray per mucosa orale.
Contenitore multidose da 15 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Farmaka s.r.l. – Via Villapizzone, 26 – 20156 Milano (MI)

Produttore
ITC Production s.r.l. – Via Pontina, Km 29 – 00071 Pomezia (RM)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 11/2026