

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 4 giorni.

**Contenuto di questo foglio:**

1. Cos'è Viractive e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Viractive
3. Come usare Viractive
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Viractive
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

**1. Cos'è Viractive e a cosa serve**

Viractive contiene *aciclovir*, una sostanza con proprietà antivirali, in grado di contrastare le infezioni causate da alcuni virus (*Herpes*).

Viractive si usa per trattare le infezioni ricorrenti della pelle, causate dal virus *Herpes Simplex* a livello delle labbra (*Herpes labialis*).

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 4 giorni.

**2. Cosa deve sapere prima di usare Viractive**

**Non usi Viractive**

- se è allergico al principio attivo, al valaciclovir o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- nei bambini che hanno meno di 12 anni.

**Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Viractive.

NON applichi Viractive all'interno della bocca, negli occhi (presti attenzione a non toccarsi gli occhi dopo aver applicato la crema, lavi sempre bene le mani prima e dopo l'applicazione della crema) o in vagina, perché potrebbe causare delle irritazioni.

Inoltre NON tocchi o sfregi con un tessuto le lesioni per evitare il peggioramento o la trasmissione dell'infezione, in particolare quando le lesioni sono aperte.

È possibile che in seguito all'uso, soprattutto se prolungato, possano manifestarsi fenomeni di sensibilizzazione, cioè fenomeni di allergia nei confronti del farmaco o di altri medicinali strutturalmente simili. Deve **interrompere il trattamento e avvertire subito il medico** se dovesse manifestare eruzioni cutanee, prurito, orticaria, difficoltà a respirare (broncospasmo) o a deglutire,

gonfiore del viso, delle mani e dei piedi, degli occhi, delle labbra e/o della lingua (angioedema), perché potrebbero essere i sintomi di reazioni allergiche anche gravi.

Faccia particolare attenzione e chiedi consiglio al medico prima di prendere Viractive se soffre di malattie che hanno indebolito il suo sistema immunitario (ad esempio se è affetto da AIDS o se ha subito un trapianto del midollo osseo) perché, in questo caso, l'uso del medicinale non è raccomandato.

### **Bambini**

Viractive 5% crema non deve essere usato nei bambini di età inferiore a 12 anni.

### **Altri medicinali e Viractive**

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

### **Gravidanza, allattamento e fertilità**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Viractive 5% crema non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

### **Viractive contiene:**

- 600 mg di **glicole propilenico** per tubo da 3 g: può causare irritazioni cutanee;
- **alcool cetostearilico**: può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatite da contatto);
- 22,5 mg di **sodio laurilsolfato** per tubo da 3 g: può causare irritazione della pelle (sensazione di pizzicore o bruciore) o intensificare le reazioni sulla pelle causate da altri medicinali quando applicati sulla stessa area.

## **3. Come usare Viractive**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Viractive è solo per uso esterno.

### *Adulti e bambini sopra i 12 anni*

La dose raccomandata è di 5 applicazioni al giorno ad intervalli di circa 4 ore, escluse le ore notturne. Applichi la quantità di crema necessaria per coprire l'intera zona infetta, compresi i bordi esterni delle eventuali vescicole.

La terapia con aciclovir deve durare almeno 4 giorni; nel caso in cui l'infezione non sia guarita il medico può consigliare di continuare il trattamento, senza superare i 10 giorni di cura.

Si rivolga al medico anche se il disturbo si presenta ripetutamente o se nota un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Applichi Viractive crema sulle lesioni, sulle zone dove queste si stanno sviluppando o non appena nota la comparsa dei primi sintomi tipici dell'Herpes (prurito, sensazione di bruciore o dolore).

Lavi sempre bene le mani prima e dopo l'applicazione di Viractive ed eviti di sfregare inutilmente le lesioni o di toccarle con un asciugamano per evitare la trasmissione dell'infezione.

### **Se usa più Viractive di quanto deve**

L'ingestione accidentale del contenuto di questo medicinale o l'applicazione locale di quantità eccessive della crema non comporta l'insorgenza di effetti indesiderati gravi, ma potrebbe causare irritazione alle mucose della bocca o della pelle.

Per qualsiasi dubbio si rivolga al medico o al farmacista.

#### **Se dimentica di usare Viractive**

Se ha dimenticato di applicare la crema non si preoccupi. Applichi la crema appena si ricorda e poi continui il trattamento come prima. Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

**Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.**

#### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Deve **interrompere il trattamento e avvertire subito il medico** se dovesse manifestare eruzioni cutanee, prurito, orticaria, difficoltà a respirare (broncospasmo) o a deglutire, gonfiore del viso, delle mani e dei piedi, degli occhi, delle labbra e/o della lingua (angioedema), perché potrebbero essere i sintomi di reazioni allergiche anche gravi che si manifestano molto raramente.

Altri effetti indesiderati possono essere:

##### **Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100)**

- bruciore o dolore transitorio;
- moderata secchezza o desquamazione della pelle (esfoliazione cutanea);
- prurito.

##### **Raro (può interessare fino a 1 persona su 1.000)**

- irritazione della pelle (eritema);
- infiammazione della pelle, a seguito dell'applicazione, dovuta al contatto con la crema (dermatite da contatto).

##### **Molto raro (può interessare fino a 1 persona su 10.000)**

- reazioni allergiche (ipersensibilità) immediate che includono gonfiore delle labbra, del viso, del collo e della gola (angioedema) e reazione della pelle (orticaria).

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema di segnalazione nazionale all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

#### **5. Come conservare Viractive**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Viractive**

- Il principio attivo è l'aciclovir. 100 g di crema contengono 5 g di aciclovir.
- Gli altri componenti sono: polossamero 407, alcool cetostearilico, sodio laurilsolfato, vaselina bianca, paraffina liquida, glicole propilenico, saccarosio monopalmitato, acqua depurata.

### **Descrizione dell'aspetto di Viractive e contenuto della confezione**

Viractive si presenta in una scatola contenente un tubo di crema da 3 g.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

*Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

ratiopharm GmbH - Graf-Arco-Strasse 3 - Ulm (Germania)

*Produttore*

Doppel Farmaceutici S.r.l. - Via Martiri delle Foibe, 1 - Cortemaggiore (PC) Italia

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il Marzo 2022**