

Foglio illustrativo: informazioni per l'utente

ACIDO SALICILICO MARCO VITI 20 mg/g unguento
ACIDO SALICILICO MARCO VITI 50 mg/g unguento
ACIDO SALICILICO MARCO VITI 100 mg/g unguento

Acido salicilico

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è ACIDO SALICILICO MARCO VITI e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare ACIDO SALICILICO MARCO VITI
3. Come usare ACIDO SALICILICO MARCO VITI
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare ACIDO SALICILICO MARCO VITI
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è ACIDO SALICILICO MARCO VITI e a cosa serve

ACIDO SALICILICO MARCO VITI contiene il principio attivo acido salicilico che appartiene al gruppo di medicinali chiamati cheratolitici che distruggono la cheratina in eccesso.

Questo medicinale è indicato negli adulti e nei bambini per:

- il trattamento di psoriasi, acne vulgaris, seborrea;
- la rimozione di verruche e calli.

Negli adulti ACIDO SALICILICO MARCO VITI è indicato anche per il trattamento di problemi della pelle come eczemi ed ittiosi.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

2. Cosa deve sapere prima di usare ACIDO SALICILICO MARCO VITI

Non usi ACIDO SALICILICO MARCO VITI

- se è allergico all'acido salicilico, ai salicilati o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se il paziente è un bambino di età inferiore ai 2 anni;
- se soffre di diabete;
- se soffre di malattie alle vene (vasculopatia periferica).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare ACIDO SALICILICO MARCO VITI.

Non ingerisca il medicinale ed eviti di mettere ACIDO SALICILICO MARCO VITI a contatto con bocca, occhi, genitali e altre mucose.

ACIDO SALICILICO MARCO VITI è irritante e può provocare infiammazione della pelle (dermatiti).

Se utilizza questo medicinale per il trattamento di calli e verruche, protegga la pelle sana intorno alla zona da trattare.

Eviti di utilizzare ACIDO SALICILICO MARCO VITI:

- per lunghi periodi di tempo;
- in quantità elevate;
- su estese zone del corpo;
- su pelle lesa o infiammata.

Una quantità eccessiva del medicinale può causare reazioni avverse molto gravi, specie nei bambini, (avvelenamento sistemico da salicilati) che può essere fatale.

Bambini

Questo medicinale deve essere somministrato con cautela nei bambini e sotto il controllo del medico.

Altri medicinali e ACIDO SALICILICO MARCO VITI

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Faccia particolare attenzione e informi il medico se sta assumendo o ha assunto recentemente i seguenti medicinali:

- **anticoagulanti** cumarinici come acenocumarolo, dicumarolo, fenprocumon e warfarin, o altri anticoagulanti come anisindione, fenidione, perché può aumentare il rischio di sanguinamento;
- **inibitori del fattore X** attivato dalla coagulazione (eparine ed eparionidi), poiché in caso di anestesia neuroassiale (spinale o epidurale), l'uso contemporaneo di acido salicilico può provocare un rapido aumento del rischio di sanguinamento e di ematoma.
- **gliburide**, un medicinale utilizzato per il trattamento del diabete, perché possono diminuire i livelli di zucchero nel sangue;
- **probenecid**, un medicinale utilizzato per il trattamento della gotta, perché l'acido salicilico può invertirne gli effetti;
- **acetazolamide**, un medicinale utilizzato contro la pressione alta negli occhi (glaucoma), perché gli effetti indesiderati dell'acido salicilico possono aumentare;
- **vaccino della varicella**, perché aumenta il rischio di una malattia chiamata sindrome di Reye, una malattia che colpisce cervello e fegato.

Eviti di usare ACIDO SALICILICO MARCO VITI insieme alle seguenti sostanze perché si può verificare un rapido aumento dei livelli di medicinale nel sangue:

- **tamarindo**;
- **Salvia miltiorrhiza** o **Tan-Shen**.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Eviti di usare ACIDO SALICILICO MARCO VITI se è in stato di gravidanza o se sta allattando al seno, se non in caso di assoluta necessità.

Non deve usare Acido Salicilico Marco Viti unguento durante la gravidanza, ad eccezione di un trattamento a breve termine di una singola area di piccole dimensioni della cute/una verruca/un callo/un occhio di pernice.

Le forme orali (ad esempio le compresse) di questa classe di medicinali possono causare effetti avversi nel feto. Non è noto se gli stessi rischi siano da considerare per Acido Salicilico Marco Viti unguento quando è usato su cute/verruche/calli/occhi di pernice.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non altera la capacità di guidare e di utilizzare macchinari.

3. Come usare ACIDO SALICILICO MARCO VITI

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Applichi la minima quantità di unguento sulla zona da trattare con un leggero massaggio. Inizi il trattamento applicando il medicinale soltanto su una piccola porzione di pelle oppure una sola volta al giorno, così da non irritare la pelle.

Se usa più ACIDO SALICILICO MARCO VITI di quanto deve

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio per questo medicinale se applicato sulla pelle localmente. Tuttavia, in caso di uso prolungato e su estese zone del corpo o su zone in cui la pelle è lesa e infiammata, si potrebbero verificare sintomi del salicilismo come nausea, vomito, disturbi dell'udito (acufeni o tinnito) e vertigini.

Raramente si possono verificare anche problemi respiratori (asma), problemi a stomaco (ulcera gastrica), fegato (epatotossicità), reni (insufficienza renale), pancreas (tossicità pancreatica).

In caso di ingestione/assunzione accidentale di ACIDO SALICILICO MARCO VITI, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Frequenza non nota (la cui frequenza non può essere stabilita sulla base dei dati disponibili):

- diminuzione dei livelli di glucosio nel sangue (ipoglicemia);
- irritazione e infiammazione della pelle (dermatiti, eritema, bruciore, prurito, desquamazione della pelle), cicatrici sul viso.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare ACIDO SALICILICO MARCO VITI

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Tenere il tubo ben chiuso per proteggere il medicinale al riparo dalla luce.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese e al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

Dopo la prima apertura del contenitore, il medicinale deve essere utilizzato entro 12 mesi. Trascorso tale periodo il medicinale residuo deve essere eliminato.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene ACIDO SALICILICO MARCO VITI 20 mg/g unguento

- Il principio attivo è acido salicilico. 1 g di unguento contiene 20 mg di acido salicilico.
- L'altro componente è vaselina bianca.

Cosa contiene ACIDO SALICILICO MARCO VITI 50 mg/g unguento

- Il principio attivo è acido salicilico. 1 g di unguento contiene 50 mg di acido salicilico.
- L'altro componente è vaselina bianca.

Cosa contiene ACIDO SALICILICO MARCO VITI 100 mg/g unguento

- Il principio attivo è acido salicilico. 1 g di unguento contiene 100 mg di acido salicilico.
- L'altro componente è vaselina bianca.

Descrizione dell'aspetto di ACIDO SALICILICO MARCO VITI e contenuto della confezione

ACIDO SALICILICO MARCO VITI si presenta come un unguento ed è contenuto in un tubo da 30 g.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Marco Viti Farmaceutici S.p.A. - Via Mentana, 38 - 36100 (Vi) - Italia.

Produttore

Zeta Farmaceutici S.p.A. - Via Galvani, 10 - 36066 Sandrigo (VI) - Italia.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Dicembre 2024