

Foglio illustrativo: Informazioni per l'utilizzatore

Cetirizina Mylan Generics 10 mg compresse rivestite con film

cetirizina dcloridrato
Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Cetirizina Mylan Generics e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Cetirizina Mylan Generics
3. Come prendere Cetirizina Mylan Generics
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Cetirizina Mylan Generics
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Cetirizina Mylan Generics e a cosa serve

Cetirizina dcloridrato è il principio attivo di Cetirizina Mylan Generics.

Cetirizina Mylan Generics è un farmaco antiallergico.

Negli adulti e nei bambini a partire dai 6 anni di età, Cetirizina Mylan Generics è indicato:

- per il trattamento di sintomi nasali e oculari della rinite allergica stagionale e perenne.
- per il trattamento dell'orticaria cronica (orticaria cronica idiopatica).

2. Cosa deve sapere prima di prendere Cetirizina Mylan Generics

Non prenda Cetirizina Mylan Generics

- se ha una grave malattia renale;
- se è allergico alla cetirizina dcloridrato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6), all'idrossizina o ai derivati della piperazina (principi attivi strettamente correlati di altri medicinali).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Cetirizina Mylan Generics.

- Se ha problemi ai reni, può aver bisogno di prendere una dose inferiore. La nuova dose verrà definita dal medico.
- Se ha problemi quando urina (come problemi alla colonna vertebrale, alla prostata o alla vescica), si rivolga al medico per un consulto.
- Se è un paziente epilettico o un paziente a rischio di convulsioni

Test cutaneo

Se deve effettuare un test allergico cutaneo, informi il medico che sta assumendo le compresse, poiché questo farmaco può influenzare i risultati del test cutaneo. È necessario interrompere il trattamento tre giorni prima della prova.

Bambini

Non dia questo medicinale a bambini al di sotto dei 6 anni perché la formulazione in compresse non permette i necessari aggiustamenti della dose.

Altri medicinali e Cetirizina Mylan Generics

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Cetirizina Mylan Generics con cibo, bevande e alcol

Il cibo non influenza sull'assorbimento della Cetirizina Mylan Generics.

Non sono state osservate interazioni clinicamente significative tra alcol (al livello nel sangue di 0,5 per mille (g/l) corrispondente a un bicchiere di vino) e cetirizina utilizzata alle dosi raccomandate. Tuttavia, non ci sono dati disponibili sulla sicurezza quando si assumono insieme dosi più elevate di cetirizina e alcol.

Pertanto, come accade con tutti gli antistaminici, è consigliabile evitare di prendere Cetirizina Mylan Generics con alcol.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

L'assunzione di Cetirizina Mylan Generics deve essere evitata dalle donne in gravidanza. L'uso accidentale del medicinale da parte di una donna in gravidanza non produce alcun effetto dannoso sul feto, tuttavia il medicinale deve essere assunto solo se necessario e su consiglio del medico.

La cetirizina passa nel latte materno. Non si può escludere un rischio di effetti collaterali nei neonati allattati al seno. Pertanto, non deve prendere Cetirizina Mylan Generics durante l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non c'è evidenza di compromissione dell'attenzione, della vigilanza e della capacità di guidare dopo l'assunzione di Cetirizina Mylan Generics alla dose raccomandata.

Deve osservare attentamente la sua risposta al farmaco se intende mettersi alla guida di veicoli, intraprendere attività potenzialmente pericolose o utilizzare macchinari non deve superare la dose raccomandata. Non deve superare la dose raccomandata.

Cetirizina Mylan Generics contiene lattosio

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo farmaco.

3. Come prendere Cetirizina Mylan Generics

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Come e quando prendere Cetirizina Mylan Generics

Si devono seguire queste linee guida a meno che il medico non le abbia dato differenti indicazioni circa l'uso di Cetirizina Mylan Generics.

Segua le seguenti istruzioni, altrimenti Cetirizina Mylan Generics potrebbe non essere completamente efficace. Le compresse devono essere prese con un bicchiere di liquido.

Le compresse possono essere divise in dosi uguali.

Adulti e ragazzi a partire da 12 anni:

La dose raccomandata è 10 mg una volta al giorno come una compressa.

Bambini di età compresa tra 6 e 12 anni:

La dose raccomandata è 5 mg due volte al giorno come mezza compressa due volte al giorno.

Pazienti con insufficienza renale

Ai pazienti con moderata compromissione renale si raccomanda l'assunzione di 5 mg una volta al giorno. Se soffre di una grave malattia renale, si rivolga al medico che potrà adeguare la dose di conseguenza. Se il bambino soffre di una malattia renale, si rivolga al medico che potrà adeguare la dose in base alle esigenze del bambino.

Se ritiene che l'effetto di Cetirizina Mylan Generics sia troppo debole o troppo forte, si rivolga al suo medico.

Durata del trattamento

La durata del trattamento dipende dal tipo, dalla durata e dal corso dei suoi disturbi e viene stabilita dal medico o dal farmacista.

Se prende più Cetirizina Mylan Generics di quanto deve

Se pensa di aver preso un sovradosaggio di Cetirizina Mylan Generics informi il medico.

Il medico deciderà quali misure intraprendere se necessario.

Dopo un sovradosaggio, gli effetti indesiderati sotto descritti possono comparire con intensità incrementata. Sono stati riportati eventi avversi quali confusione, diarrea, capogiri, stanchezza, mal di testa, malessere generale, dilatazione della pupilla, prurito, irrequietezza, sedazione, sonnolenza, delirio, anomalo ritmo cardiaco rapido, tremori e incapacità di svuotare completamente la vescica.

Se dimentica di prendere Cetirizina Mylan Generics

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Cetirizina Mylan Generics

Se interrompe il trattamento con Cetirizina Mylan Generics possono raramente ripresentarsi prurito (pizzicore intenso) e/o orticaria.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se ha ulteriori domande sull'uso di questo medicinale, si rivolga al suo medico o farmacista.

Alcuni effetti indesiderati possono essere gravi:

Molto raro (può interessare fino a 1 persona su 10.000)

- segni improvvisi di allergia, quali eruzione cutanea, prurito o orticaria sulla pelle, gonfiore del viso, labbra, lingua o gola o altre parti del corpo, respiro corto, respiro affannoso o difficoltà respiratorie

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- Pensieri suicidari
- Impossibilità ad urinare
- Incapacità di svuotare completamente la vescica

Se si verifica uno di questi effetti riportati sopra, deve interrompere l'assunzione di questo medicinale e informare immediatamente il medico.

Altri possibili effetti indesiderati

Comune (può interessare fino a 1 persona su 10)

- Stanchezza
- Secchezza della bocca
- Sensazione di malessere
- Capogiri
- Mal di testa
- Sonnolenza

- Mal di gola e difficoltà nella deglutizione

Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100)

- Debolezza
- Sensazione generale di malessere
- Formicolio o intorpidimento delle mani o dei piedi
- Agitazione
- Prurito
- Eruzione cutanea
- Diarrea
- Mal di stomaco

Rari (possono interessare fino a 1 su 1.000 persone)

- Battito cardiaco accelerato
- Test di funzionalità epatica anormali
- Aumento di peso
- Convulsioni
- Aggressività
- Confusione
- Depressione
- Vedere, sentire o udire cose che non esistono
- Difficoltà a dormire
- Ipersensibilità (di solito si verifica con reazioni della pelle come eruzioni cutanee, pelle arrossata e pruriginosa)
- Orticaria
- Gonfiore, ritenzione di liquidi (edema)

Molto raro (può interessare fino a 1 persona su 10.000)

- Sanguinamento o lividi più facilmente del normale
- Tic (spasmo abituale)
- Visione offuscata, occhi con movimenti circolari incontrollati
- Disturbo dell'accomodazione (difficoltà di messa a fuoco)
- Svenimento
- Tremore
- Disturbi o perdita del gusto
- Movimenti del corpo incontrollati
- Contrazioni muscolari involontarie
- Minzione difficile, dolorosa o involontaria

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- Perdita di memoria
- Compromissione della memoria
- Aumento dell'appetito
- Vertigini (sensazione di giramento), incubo
- Prurito (pizzicore intenso) e/o orticaria a seguito di sospensione del trattamento
- Artralgia (dolore articolare), mialgia (dolore muscolare)
- Pustolosi esantematica acuta generalizzata (eruzione cutanea con vescicole contenenti pus)
- Epatite (infiammazione al fegato)

Effetti indesiderati nei bambini e negli adolescenti

Nei bambini e negli adolescenti, i seguenti effetti indesiderati si verificano più comunemente e possono interessare fino a 1 su 10 persone:

- Naso che cola o intasato
- Diarrea

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Cetirizina Mylan Generics

Conservi Cetirizina Mylan Generics fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi Cetirizina Mylan Generics dopo la data di scadenza che è riportata sull'etichetta e sulla scatola. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Blister: Questo farmaco non richiede alcuna speciale condizione per la conservazione.

Flacone: Conservare ad una temperatura inferiore a 25°C.

6. Altre informazioni

Cosa contiene Cetirizina Mylan Generics

- Il principio attivo di Cetirizina Mylan Generics è cetirizina dicloridrato. Ogni compressa rivestita con film contiene 10 mg di cetirizina dicloridrato.

- Gli altri componenti sono lattosio monoidrato (vedere paragrafo 2 "Cetirizina Mylan Generics contiene lattosio), amido di mais pregelatinizzato, povidone, magnesio stearato, ipromellosa (E464), macrogol, titanio diossido (E 171) e talco.

Descrizione dell'aspetto di Cetirizina Mylan Generics e contenuto della confezione

Compressa rivestita con film in forma di capsula, bianca, con linea di frattura, con impresso "CZ" e "10" su di un lato e "G" sull'altro.

Flacone con 30, 100 e 250 compresse e blister con 7, 10, 14, 15, 20, 30, 50, 50 (50x1) 60, 90 ,100, 100 (10x10x1) compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Mylan S.p.A.

Via Vittor Pisani 20 – 20124 Milano, Italia

Responsabile del rilascio dei lotti:

Mylan B.V.
Krijgsman 20,
Amstelveen, 1186DM,
Paesi Bassi

Mylan Hungary Ltd.
Mylan utca 1,
Komarom, 2900,
Ungheria

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

Danimarca: Cetirizin Mylan

Italia: Cetirizina Mylan Generics 10 mg compresse rivestite con film

Olanda: Cetirizine diHCl Mylan 10 mg filmomhulde tabletten

Norvegia: Cetirizin Mylan

Portogallo: Cetirizina Mylan

Spagna: Cetirizina Viatris 10 mg, comprimidos recubiertos con película EFG

Svezia: Cetirizin Mylan 10 mg filmdragerad tablett

Regno Unito: Cetirizine 10 mg Film-coated Tablets

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 06/2024