

**Foglio illustrativo: informazioni per il paziente**  
**Canesten 1% polvere cutanea**  
clotrimazolo

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 3-4 settimane.

**Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Canesten e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Canesten
3. Come usare Canesten
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Canesten
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

**1. Che cos'è Canesten e a cosa serve**

Canesten contiene clotrimazolo che è un antimicotico (antifungino) per uso dermatologico, cioè che agisce localmente eliminando i funghi della pelle.

Canesten polvere si usa per il trattamento delle micosi (funghi) umide della pelle e delle pieghe cutanee soprattutto se localizzate in zone coperte o scarsamente aerate (ad esempio: tinea pedis o piede d'atleta, tinea cruris, tinea inguinalis).

**2. Cosa deve sapere prima di usare Canesten**

**Non usi Canesten**

- se è allergico al clotrimazolo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale. (elencati al paragrafo 6).

**Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Canesten se ha già sofferto in passato di questi disturbi (recidive di micosi).

Si sconsiglia l'uso di pannolini non traspiranti dopo l'applicazione del medicinale nelle dermatiti da pannolino.

Eviti il contatto con gli occhi. Non ingerisca.

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso cutaneo (applicati sulla pelle), può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione quali eritema (rossore localizzato nella zona della pelle dove viene applicato il medicinale) e prurito. In tal caso interrompa il trattamento e consulti il medico o il farmacista.

**Altri medicinali e Canesten**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono noti medicinali che possano modificare l'effetto del Canesten polvere.

### **Canesten con il cibo**

Non sono noti alimenti che possano modificare l'effetto del Canesten polvere.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

### **Gravidanza**

Durante i primi 3 mesi di gravidanza deve essere consultato il medico prima di usare Canesten.

### **Allattamento**

Canesten può essere usato durante l'allattamento con latte materno. Se usato localmente sulla zona del capezzolo, lavare il seno prima di allattare il bambino.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Il medicinale non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

## **3. Come usare Canesten**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Canesten polvere è particolarmente adatto per il trattamento delle zone coperte o scarsamente aerate della pelle e delle pieghe cutanee.

Canesten polvere va applicato in piccole quantità 2-3 volte al giorno, in corrispondenza delle parti da trattare.

Canesten polvere va applicato dopo aver lavato ed asciugato accuratamente la parte interessata.

Nel piede d'atleta si consiglia di cospargere con Canesten polvere anche l'interno delle calze e delle scarpe.

**Attenzione:** non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

### **Durata del trattamento**

In genere, per la scomparsa delle manifestazioni, è sufficiente un periodo di trattamento di 3-4 settimane.

Prosegua la terapia con Canesten polvere per almeno 2 settimane dopo la scomparsa delle manifestazioni al fine di consolidare i risultati terapeutici ottenuti ed evitare reinfezioni.

Nel caso in cui dopo 3-4 settimane di impiego continuativo non nota risultati apprezzabili, consulti il medico.

Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

**Note di educazione sanitaria** Per prevenire la micosi e le sue recidive è utile seguire alcune norme di carattere igienico sanitario, quali:

- Eviti di camminare a piedi nudi nei luoghi pubblici come piscine, palestre, camere di albergo etc.
- Se pratica sport utilizzi calzature traspiranti e comode, le cui solette plantari dovrebbero essere cambiate o lavate periodicamente.
- Limiti l'utilizzo di indumenti contenenti fibre sintetiche.
- Cambi frequentemente il pannolino al neonato per evitare il ristagno di urina o feci sulla pelle.
- Sottoponga cani e gatti a visita veterinaria prima di accoglierli nell'ambiente domestico.
- Osservi ulteriori precauzioni igieniche, come tenere separati gli indumenti e lavarli ad elevata temperatura, qualora un membro della famiglia manifesti una micosi.

### **Se usa più Canesten di quanto deve**

Non si prevede alcun rischio di intossicazione acuta dal momento che è poco probabile che la stessa si verifichi dopo singola applicazione cutanea di una dose eccessiva (applicazione estesa in condizioni favorevoli all'assorbimento) o per involontaria assunzione orale. Non esiste un antidoto specifico.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di Canesten polvere avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

### **Se dimentica di usare Canesten**

Continui il trattamento attenendosi alla dose consigliata dal medico. Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

**Se si ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.**

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Con Canesten sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati, la cui frequenza non è nota:

**Disturbi del sistema immunitario:** angioedema (gonfiore), reazione anafilattica, ipersensibilità

**Patologie vascolari:** ipotensione (pressione bassa), sincope.

**Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche:** affanno

**Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo:** bolle, dermatite da contatto, eritema (arrossamento della pelle), parestesia, desquamazione della pelle (perdita di cellule dello strato più superficiale della pelle), prurito, eruzione cutanea, orticaria, dolore pungente della pelle, sensazione di bruciore della pelle.

**Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione:** irritazione al sito di applicazione, reazione al sito di applicazione, edema, dolore.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare Canesten**

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese. La data di scadenza si intende per il prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Canesten polvere FI 8a

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Canesten**

- Il principio attivo è clotrimazolo. 100 g polvere cutanea contengono 1g di clotrimazolo
- L' altro componente è: amido di riso.

### **Descrizione dell'aspetto di Canesten e contenuto della confezione**

Canesten si presenta in forma di polvere per uso cutaneo.

Il contenuto della confezione è di 30 g.

### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

#### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

Bayer S.p.A. - Viale Certosa 130 - Milano

#### **Produttore**

**KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH**, Projensdorfer Strasse 324\_24106 Kiel, Germania

**Sigmar Italia S.p.A**, Via Sombreno, 11 24011 Almè (BG), Italia

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il Dicembre 2021**