

Foglio illustrativo: informazioni per l'utente
CLOREXIFARM 20% concentrato per soluzione cutanea
Clorexidina gluconato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è CLOREXIFARM e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare CLOREXIFARM
3. Come usare CLOREXIFARM
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare CLOREXIFARM
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è CLOREXIFARM e a che cosa serve

CLOREXIFARM contiene il principio attivo clorexidina gluconato che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antisettici e disinfettanti che riducono o bloccano la crescita dei germi. CLOREXIFARM è indicato per pulire e disinfettare la pelle, sia integra che in presenza di ferite superficiali di piccole dimensioni.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare CLOREXIFARM

Non usi CLOREXIFARM

- se è allergico alla clorexidina gluconato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare CLOREXIFARM.

Questo medicinale può essere usato solo sulla pelle (uso esterno).

Non ingerisca questo medicinale, in quanto si possono verificare conseguenze gravi, anche mortali.

Non applichi questo medicinale nella parte interna dell'orecchio.

CLOREXIFARM non deve entrare in contatto con gli occhi a causa del rischio di lesioni della visione. Se entra in contatto con gli occhi, lavare immediatamente e accuratamente con acqua. In caso di irritazione, arrossamento o dolore all'occhio o disturbo visivo, si rivolga immediatamente a un medico.

A seguito di contatto accidentale di prodotti analoghi con l'occhio durante interventi chirurgici su pazienti in anestesia generale (sonno profondo indotto) sono stati segnalati casi gravi di traumatismo corneale permanente (lesione della superficie dell'occhio). Tali lesioni possono rendere necessario il trapianto di cornea.

Eviti di usare questo medicinale per periodi prolungati, in quanto se usa CLOREXIFARM per molto tempo, si possono manifestare reazioni allergiche (fenomeni di ipersensibilizzazione). In tal caso, interrompa il trattamento e si rivolga al medico che stabilirà una terapia idonea.

Prima di applicare una medicazione (medicazioni di tipo occlusivo) su aree del corpo che sono state trattate con CLOREXIFARM, è necessario assicurarsi che non sia presente un eccesso di medicinale in questa zona.

Bambini

CLOREXIFARM può provocare ustioni chimiche nei neonati, soprattutto in quelli nati prematuramente.

Altri medicinali e CLOREXIFARM

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Durante il trattamento con CLOREXIFARM, eviti di usare altri medicinali simili (antisettici e/o detergenti).

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Può usare questo medicinale se è in gravidanza e se sta allattando al seno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non influenza la capacità di guidare o di usare macchinari.

3. Come usare CLOREXIFARM

Usi CLOREXIFARM seguendo sempre esattamente le istruzioni contenute in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Usi questo medicinale solo dopo opportuna diluizione in acqua (5 ml di CLOREXIFARM 20% in 2 litri di acqua).

Tamponi la cute con del cotone imbevuto di CLOREXIFARM diluito.

Se necessario, ripeta l'applicazione fino ad un massimo di 3-4 volte al giorno.

Non superi le dosi indicate.

Se usa più CLOREXIFARM di quanto deve

Non sono noti casi di sovradosaggio.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di CLOREXIFARM avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono manifestare i seguenti effetti indesiderati:

Frequenza non nota (la cui frequenza non può essere valutata dai dati disponibili):

- bruciore o irritazione della pelle (intolleranza). Questi effetti sono generalmente transitori e non richiedono modifiche del trattamento;
- bruciate (ustioni chimiche) nei neonati;
- traumatismo corneale (lesione della superficie dell'occhio) e danno oculare permanente, compresa compromissione permanente della visione (dopo l'esposizione accidentale degli occhi durante interventi chirurgici alla testa, al viso e al collo) in pazienti in anestesia generale (sonno profondo indotto).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare CLOREXIFARM

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare a temperatura non superiore a 30°C, nella confezione originale per riparare il prodotto dalla luce.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene CLOREXIFARM

- Il principio attivo è clorexidina gluconato. 100 g di soluzione contengono 20 g di clorexidina gluconato.
- L'altro componente è acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di CLOREXIFARM e contenuto della confezione

Flacone da 1000 ml di soluzione con tappo a vite.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Nuova Farmec S.r.l. - Via W. Flemming, 7 - Settimo di Pescantina (VR) - Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: Settembre 2024