

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore
SODIO CLORURO S.A.L.F. 0,9% solvente per uso parenterale
Sodio cloruro

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è SODIO CLORURO S.A.L.F. e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare SODIO CLORURO S.A.L.F.
3. Come usare SODIO CLORURO S.A.L.F.
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare SODIO CLORURO S.A.L.F.
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è SODIO CLORURO S.A.L.F. e a cosa serve

SODIO CLORURO S.A.L.F. è una soluzione che contiene sodio e cloro ed è indicato per allestire preparazioni iniettabili.

2. Cosa deve sapere prima di usare SODIO CLORURO S.A.L.F.

Non usi SODIO CLORURO S.A.L.F. se è affetto da:

- ipernatremia (ha un'elevata concentrazione di sodio nel sangue);
- pletore idrosaline (ha un'aumentata concentrazione di sali nell'organismo).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico, al farmacista o l'infermiere prima di usare SODIO CLORURO S.A.L.F.

Questo medicinale deve essere somministrato con cautela se:

- soffre di ipertensione (pressione alta);
- soffre di insufficienza cardiaca (incapacità del cuore di pompare l'adeguata quantità del sangue necessaria alle esigenze dell'organismo);
- se ha un edema periferico (accumulo di liquido alle estremità, come per es. alle gambe, alle caviglie e alle mani) o edema polmonare (accumulo di liquidi nei polmoni);
- se ha una funzionalità renale ridotta (i suoi reni funzionano poco);
- se le è stata diagnosticata una pre eclampsia (se è in corso di gravidanza ed ha iniziato ad avere problemi di pressione alta o la sua ipertensione è peggiorata e ha notato un gonfiore dovuto ad accumulo di liquidi e presenza di proteine nelle urine).

Altri medicinali e SODIO CLORURO S.A.L.F.

Informi il medico, il farmacista o l'infermiere se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Informi il medico se sta assumendo corticosteroidi (medicinali per il trattamento delle infiammazioni) o corticotropinici (medicinali che stimolano la produzione di ormoni) perché possono causare accumulo di liquidi e aumentare la pressione.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza

Il medico le prescriverà SODIO CLORURO S.A.L.F. solo in caso di effettiva necessità.

Allattamento

Questo medicinale può essere usato durante l'allattamento con latte materno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

SODIO CLORURO S.A.L.F. non altera la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

3. Come usare SODIO CLORURO S.A.L.F.

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Questo medicinale le verrà somministrato da un medico o un infermiere.

Utilizzare per soluzioni, diluizioni o sospensioni estemporanee di medicinali iniettabili o di altre preparazioni sterili.

Scegliere il volume da impiegare in base alle esigenze di diluizione della preparazione iniettabile.

Se usa più SODIO CLORURO S.A.L.F. di quanto deve

Se le viene somministrata una quantità eccessiva di questo medicinale può verificarsi un aumento della concentrazione di alcuni sali nel sangue, come sodio e cloro e un aumento del volume del sangue.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati con frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- ipernatriemia (aumento della concentrazione di sodio nel sangue),
- ipercloremia (aumento della concentrazione di cloro nel sangue);
- ipervolemia (aumento del volume del sangue),
- infezione nel sito di infusione,
- dolore o reazione locale,
- irritazione delle vene,

- trombosi venosa (formazione di coaguli di sangue nella vena) o flebite (infiammazione della vena) che si estende dal sito di infusione,
- stravaso (fuoriuscita della soluzione iniettata dalla vena).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite l'Agenzia Italiana del Farmaco sito web: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare SODIO CLORURO S.A.L.F.

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza".

La data di scadenza indicata si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare nel contenitore ermeticamente chiuso. Non congelare o refrigerare.

Si rimanda, inoltre, alle condizioni di conservazione del medicinale che si intende somministrare.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene SODIO CLORURO S.A.L.F.

SODIO CLORURO S.A.L.F. 0,9% solvente per uso parenterale

- Il principio attivo è sodio cloruro. 100 ml di soluzione contengono 0,9 g di sodio cloruro, mEq/ml: Na⁺ 0,154, mEq/ml: Cl⁻ 0,154, Osmolarità teorica (mOsm/l): 308, pH: 4,5 - 7,0.
- L'altro componente è acqua per preparazioni iniettabili.

Descrizione dell'aspetto di SODIO CLORURO S.A.L.F. e contenuto della confezione

Solvente per uso parenterale.

SODIO CLORURO S.A.L.F. 0,9% solvente per uso parenterale

Confezioni da 5 fiale in vetro da 2, 5 e 10 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico, Via Marconi 2, 24069 Cenate Sotto (BG) , Italia.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: Luglio 2024

Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari:

La soluzione deve essere limpida, incolore e priva di particelle visibili.

Usare immediatamente dopo l'apertura.

La preparazione deve avvenire nel più breve tempo possibile in condizioni di sterilità.

Per uso singolo. Eliminare ogni residuo non utilizzato.

Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.