



FOGLIO ILLUSTRATIVO

Legga attentamente questo foglio poiché contiene importanti informazioni per lei.

Questo medicinale si può ottenere senza prescrizione.

Tuttavia, deve usarlo in modo accurato per ottenerne i migliori risultati.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha dei dubbi o desidera maggiori informazioni, si rivolga al farmacista.
- Se i sintomi peggiorano o non migliorano dopo **1-2** giorni, consulti il medico.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è GOLACETIN e a che cosa serve
2. Prima di prendere GOLACETIN
3. Come prendere GOLACETIN
4. Possibili effetti indesiderati
5. Scadenza e Conservazione

1. CHE COS'È GOLACETIN E A CHE COSA SERVE

GOLACETIN si presenta in forma di compresse.

Il contenuto della confezione è di 20 compresse da 1,3 mg di cetilpiridinio cloruro.

GOLACETIN si usa come disinfettante della mucosa orale.

2. PRIMA DI PRENDERE GOLACETIN

Non prenda GOLACETIN:

In caso di ipersensibilità (allergia) al cetilpiridinio cloruro o ad uno qualsiasi degli eccipienti di GOLACETIN.

In bambini al di sotto dei 12 anni di età, salvo diversa prescrizione medica.

Faccia attenzione soprattutto:

se dopo un breve periodo di trattamento non avverte risultati apprezzabili: in questo caso consulti il suo medico curante.

L'uso, specie se prolungato dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompa il trattamento e consulti il medico per istituire una idonea terapia.

Assunzione di GOLACETIN con cibi e bevande:

non pertinente.

Assunzione di altri medicinali:

informi il medico o il farmacista se sta assumendo altri medicinali, anche quelli senza prescrizione.

Non usare GOLACETIN contemporaneamente ad altri antisettici e detergenti.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento:

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Non vi sono dati riguardanti l'uso del cetilpiridinio cloruro in donne in gravidanza. Nelle donne in gravidanza e durante l'allattamento al seno, il medicinale va somministrato in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del Medico.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari:

GOLACETIN non interferisce con la capacità di guidare veicoli o sull'uso di macchinari.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti di GOLACETIN:

il medicinale contiene saccarosio: di ciò si tenga conto in pazienti diabetici ed in pazienti che seguono regimi dietetici ipocalorici. Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. COME PRENDERE GOLACETIN

Prenda sempre GOLACETIN seguendo esattamente le istruzioni.

La dose abituale è:

Una compressa sciolta in bocca ogni 2-3 ore, con un massimo di 8 compresse al giorno. Non superare le dosi consigliate.

Non usare GOLACETIN per periodi prolungati se non si notano effetti apprezzabili. Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Se prende più GOLACETIN di quanto deve:

Non sono noti casi di sovradosaggio. I sintomi di intossicazione, conseguenti all'ingestione di quantità rilevanti di composti ammonici quaternari, comprendono nausea, vomito, dispnea, cianosi, asfissia conseguente a paralisi dei muscoli respiratori, depressione del SNC, ipotensione e coma.

Nell'uomo la dose letale è di circa 1-3 g. Il trattamento è sintomatico: somministrare, se necessario, dei lenitivi. Evitare emesi e lavanda gastrica.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di GOLACETIN avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Se si dimentica di prendere GOLACETIN:

non prenda una dose doppia per compensare eventuali dimenticanze.

Effetti quando si interrompe il trattamento con GOLACETIN:

nessuno.

Se si ha qualsiasi dubbio sull'uso di GOLACETIN, rivolgersi al medico o al farmacista.

4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, GOLACETIN può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

È possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza locale (ad es. bruciore ed irritazione). Durante studi clinici sono stati sporadicamente segnalati: irritazione transitoria delle gengive, nausea, vomito, dolore addominale, stomatite, alterazione del gusto, lieve discolorazione dei denti, dermatite allergica.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la

comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista.

5. SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: Vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

Composizione

Una compressa contiene:

principio attivo: cetilpiridinio cloruro 1,3 mg

eccipienti: gomma arabica, magnesio stearato, aroma naturale di menta, saccarosio.

COME SI PRESENTA

GOLACETIN si presenta in forma di compresse.

Il contenuto della confezione è di 20 compresse da 1,3 mg di cetilpiridinio cloruro.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

WELLPHARMA s.r.l. – via Ninfea 110 – 25049 Iseo (BS)

Produttore

Lab. Chimico Farmaceutico A.SELLA s.r.l. – via Vicenza 67 – 36015 Schio (VI)

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco