

**FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE****Lamisil 1% soluzione cutanea**  
Terbinafina cloridrato

**Legga attentamente questo foglio prima di iniziare ad usare questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al farmacista.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 2 settimane.

**Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Lamisil Soluzione e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Lamisil Soluzione
3. Come usare Lamisil Soluzione
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Lamisil Soluzione
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

**1. CHE COS'È LAMISIL SOLUZIONE E A CHE COSA SERVE**

Lamisil Soluzione è un antifungino (antimicotico) da usare sulla pelle. Agisce uccidendo i funghi che causano problemi alla pelle.

Lamisil Soluzione è usato per curare:

- Tinea pedis (infezione micotica ai piedi o Piede d'atleta)
- Tinea cruris (infezione micotica alle pieghe inguinali)
- Tinea corporis (infezione micotica al tronco o tigna)
- Infezione della pelle provocata da un lievito chiamata *pytiriasis versicolor*.

**Se non è sicuro della causa della sua infezione, chiedi consiglio al tuo medico o al farmacista prima di usare Lamisil Soluzione.**

**2. COSA DEVE SAPERE PRIMA DI USARE LAMISIL SOLUZIONE****Non usi Lamisil Soluzione**

- se è allergico alla terbinafina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6 e alla fine del paragrafo 2).

Se questo è il suo caso **informi il medico o il farmacista e non usi Lamisil Soluzione.**

**Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Lamisil Soluzione.

- Lamisil Soluzione è esclusivamente per uso esterno
- Non utilizzare all'interno della bocca e non deglutire
- Evitare il contatto della soluzione con il viso, con gli occhi o con la pelle danneggiata dove l'alcol può essere irritante. Se la soluzione dovesse entrare accidentalmente a contatto con gli occhi, risciacquare accuratamente con acqua corrente.

- Se dovesse persistere un qualsiasi fastidio, consulti il medico
- Lamisil Soluzione contiene alcool. Tenere lontano da fiamme vive.

### **Bambini e adolescenti**

I bambini e gli adolescenti al di sotto dei 18 anni di età non devono usare Lamisil Soluzione.

### **Altri medicinali e Lamisil Soluzione**

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

- **Non applichi altri medicinali o trattamenti sull'area interessata** (compresi quelli senza prescrizione medica) contemporaneamente a Lamisil Soluzione.

### **Gravidanza, allattamento e fertilità**

- **Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.** Lamisil Soluzione non deve essere usato in gravidanza se non strettamente necessario.
- **Non usi Lamisil Soluzione se sta allattando.** Non faccia entrare in contatto il neonato con nessuna delle aree trattate, compreso il seno.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

L'uso di Lamisil Soluzione non ha influenza sulla capacità di guidare e di usare macchinari.

### **Lamisil Soluzione contiene etanolo 96%**

Questo medicinale contiene 250 mg/g di etanolo 96%.

Puo causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

### **Lamisil Soluzione contiene propilene glicole**

Questo medicinale contiene 50 mg/g di propilene glicole.

## **3. COME USARE LAMISIL SOLUZIONE**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente come descritto in questo foglio o secondo le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

**La dose raccomandata è l'applicazione della soluzione una o due volte al giorno per una settimana come indicato sotto.**

### **Indicazioni per l'uso:**

#### **Adulti**

- Pulire e asciugare la pelle interessata dall'infezione e l'area circostante, poi lavare le mani.
- Svitare il tappo e schiacciare delicatamente il flacone.
- Applicare un quantitativo di soluzione sufficiente a inumidire completamente la pelle interessata dall'infezione e l'area circostante.
- Richiudere il flacone con il tappo.
- Lavare le mani dopo aver usato la soluzione, per evitare di diffondere l'infezione ad altre aree della propria pelle o altre persone.

### **Con quale frequenza e per quanto tempo deve usare Lamisil Soluzione**

Se non diversamente indicato dal medico, applichi la soluzione una o due volte al giorno sulle aree interessate come descritto di seguito:

- **Tinea pedis (Piede d'atleta):** applicare una volta al giorno per una settimana
- **Tinea cruris e tinea corporis:** applicare una volta al giorno per una settimana
- **Pytirisias versicolor:** applicare due volte al giorno per una settimana

La pelle dovrebbe iniziare a migliorare entro pochi giorni, ma possono essere necessarie fino a 4 settimane affinché la pelle si rigeneri completamente.

Se non osserva alcun segno di miglioramento dopo 2 settimane dall'inizio del trattamento con Lamisil Soluzione, si rivolga al medico o al farmacista.

Getti via la soluzione rimasta dopo 12 settimane dalla prima apertura del flacone.

#### **Come ottimizzare il trattamento**

Tenga pulita l'area interessata dall'infezione lavandola regolarmente. L'asciughi perfettamente senza sfregare, ma tamponandola delicatamente. Sebbene l'area possa essere pruriginosa, cerchi di non grattarsi perché così facendo potrebbe causare un danno maggiore, e rallentare così il processo di guarigione o diffondere ulteriormente l'infezione.

Usi asciugamani e indumenti personali, non li condivida con altre persone in quanto queste infezioni possono trasmettersi facilmente. Li lavi frequentemente per proteggersi da reinfezioni.

#### **Se dimentica di usare Lamisil Soluzione**

Se dimentica una applicazione, applichi la soluzione appena può e poi continui seguendo il solito schema di applicazioni. Tuttavia, se è quasi ora per l'applicazione successiva, applichi la solita quantità di soluzione e continui seguendo il normale schema di applicazioni. Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Usi la soluzione seguendo le indicazioni. Questo è importante perché, saltando le applicazioni, l'infezione rischia di ritornare.

#### **Se ingerisce accidentalmente Lamisil Soluzione**

Informi immediatamente il medico che le consiglierà come procedere. Deve essere tenuto in considerazione il contenuto di alcool.

#### **Se accidentalmente Lamisil Soluzione entra in contatto con gli occhi**

Risciacqui gli occhi accuratamente con acqua corrente. Contatti il medico se il fastidio rimane.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di Lamisil Soluzione, si rivolga al medico o al farmacista.

## **4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Alcune persone possono essere allergiche a Lamisil Soluzione e questo può causare **gonfiore e dolore, rash cutaneo o orticaria**. Questi effetti sono stati riportati con frequenza *non nota* (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Interrompa l'uso della soluzione e chiedi immediatamente consiglio al medico se manifesta uno qualsiasi di questi particolari sintomi.

#### **Sono stati riportati anche i seguenti effetti collaterali:**

##### **Comuni** (possono interessare fino ad una persona su 10)

Desquamazione della pelle e prurito al sito applicazione.

##### **Non comuni** (possono interessare fino ad una persona su 100)

Lesioni cutanee, croste, alterazioni cutanee, discromie della pelle, rossore, bruciore, dolore, dolore e irritazione nel sito di applicazione.

##### **Rari** (possono interessare fino ad una persona su 1000)

Secchezza cutanea, eczema, aggravamento delle condizioni.

Se Lamisil Soluzione viene accidentalmente applicato sugli occhi, può causare irritazione.

**Non nota** (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Rash

#### **Segnalazione di effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. COME CONSERVARE LAMISIL SOLUZIONE**

#### **Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.**

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul flacone. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare a temperatura superiore ai 30°C. Non refrigerare o congelare.

Chiudere il flacone con il tappo dopo l'uso. Gettare la soluzione rimasta dopo 12 settimane dalla prima apertura.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI**

#### **Cosa contiene Lamisil Soluzione**

- Il principio attivo è terbinafina cloridrato. 1 grammo di Lamisil Soluzione contiene 10 mg di terbinafina cloridrato (1% p/p).
- Gli eccipienti sono acqua depurata, etanolo 96%, propilene glicole (E1520), macrogol cetostearile etere.

#### **Descrizione dell'aspetto di Lamisil Soluzione e contenuto della confezione**

Lamisil soluzione cutanea è un liquido limpido, da incolore a giallo pallido.

Lamisil 1% soluzione cutanea è disponibile in un flacone comprimibile da 30 ml con contagocce.

#### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

Novartis Farma S.p.A.

Largo Umberto Boccioni, 1

21040 - Origgio (VA)

#### **Produttore**

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

Torre Annunziata (NA)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: 07/2021**