

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

CORSODYL 10 mg/g gel dentale clorexidina gluconato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei

- Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è CORSODYL e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare CORSODYL
3. Come usare CORSODYL
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare CORSODYL
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è CORSODYL e a cosa serve

CORSODYL contiene il principio attivo clorexidina gluconato, che appartiene alla classe di medicinali con attività antinfettiva e antisettica. CORSODYL previene e combatte le infezioni a livello orale locale, in particolare ha:

- azione disinfettante del cavo orale, anche prima e dopo estrazioni dentarie o piccoli interventi;
- azione antiplacca, aiuta a prevenire le infiammazioni delle gengive (gengiviti) o dei tessuti di sostegno dei denti (periodontiti), dovute alla formazione della placca dentale;
- azione protettiva contro le infezioni nei portatori di protesi fisse o mobili, grazie alla sua attività antisettica su denti e gengive.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo breve periodo di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare CORSODYL

Non usi CORSODYL

- Se è allergico alla clorexidina gluconato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

- Non ingerisca CORSODYL, perché è solo per uso orale esterno.
- Eviti il contatto con gli occhi o le orecchie: se il prodotto viene a contatto con gli occhi o le orecchie, lavi subito con acqua.
- Se si verificano dolore, gonfiore o irritazione della bocca, interrompa il trattamento e si rivolga al medico o al dentista.
- Inizialmente possono manifestarsi temporanee alterazioni del gusto e temporanee sensazioni di intorpidimento, pizzicore o bruciore della lingua. Questi effetti solitamente diminuiscono con l'uso continuato. In caso persistano, consulti il medico o il dentista.
- L'uso, specie se prolungato, dei medicinali per uso locale, come CORSODYL, può causare fenomeni di sensibilizzazione. In questo caso interrompa il trattamento e si rivolga al medico.

- Se compare eruzione cutanea, rigonfiamento di labbra, lingua, gola o viso, o difficoltà di respirazione, sospenda l'uso del prodotto e si rivolga immediatamente ad un medico. Tali effetti potrebbero essere segni di una rara e grave reazione allergica (vedere anche il paragrafo 4 “Possibili effetti indesiderati”). Si rivolga al medico anche se ha avuto tali disturbi in passato.
- La clorexidina gluconato può provocare una colorazione superficiale della lingua, dei denti e di alcuni materiali utilizzati per otturazioni e protesi. Le macchie non sono permanenti e possono essere in gran parte prevenute riducendo il consumo di alimenti o bevande che possono macchiare, come tè, caffè e vino rosso. La colorazione dei denti e degli apparecchi ortodontici si può prevenire con l'impiego giornaliero di un dentifricio comune. Poiché la clorexidina gluconato è incompatibile con alcuni detergenti (composti anionici, come il sodiolaurilsolfato) in genere presenti nei dentifrici comuni, usi il dentifricio prima di CORSODYL, sciacqui la bocca con acqua e attenda 5 minuti prima di utilizzare CORSODYL, oppure usi il dentifricio in un altro momento della giornata, lontano dall'uso di CORSODYL. In alcuni casi, potrà eliminare la colorazione rivolgendosi al dentista per un intervento professionale di pulizia. Nel caso di protesi ed otturazioni anteriori che presentano fessure e/o superfici ruvide, la colorazione potrebbe rimanere anche dopo un intervento professionale di pulizia. Può essere necessario anche un intervento professionale di pulizia a seguito di trattamenti (come fissaggio mascellare o applicazione di apparecchi ortodontici) che non hanno reso possibile una normale igiene orale meccanica (es: spazzolamento).

Altri medicinali e CORSODYL

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni clinicamente significative con altri medicinali.

Non è raccomandato l'uso di CORSODYL insieme ad altri antisettici (medicinali contro le infezioni).

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

CORSODYL può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non è stato segnalato, né è noto alcun effetto sulla capacità di guidare e usare macchinari.

CORSODYL gel dentale contiene poliossietilene-olio di ricino idrogenato

CORSODYL contiene poliossietilene-olio di ricino idrogenato, che può causare reazioni sulla pelle localizzate.

CORSODYL gel dentale contiene essenza di menta

CORSODYL contiene un aroma a sua volta contenente d-Limonene che può causare reazioni allergiche.

3. Come usare CORSODYL

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Quanto, come e per quanto tempo

Attenzione: non superi la dose raccomandata.

Adulti

Dose raccomandata: applichi su denti e gengive 2 cm di gel per un minuto, una o due volte al giorno, utilizzando uno spazzolino morbido o le dita.

Se porta una protesi mobile, dopo la pulizia, applichi una piccola quantità di gel sulle superfici che vengono a contatto con le gengive. Sputi il prodotto in eccesso. Non sciacqui la bocca dopo l'applicazione del gel.

Pazienti anziani

La dose raccomandata per gli adulti è adeguata anche per i pazienti anziani, salvo diversa indicazione del medico o del dentista.

Bambini e adolescenti

CORSODYL può essere usato nei bambini dai 12 anni in su con la stessa dose raccomandata per gli adulti, salvo diversa indicazione del medico o del dentista.

Nei bambini di età inferiore ai 12 anni CORSODYL deve essere utilizzato solo se prescritto dal medico o dal dentista.

Non usi CORSODYL per lunghi periodi di tempo; se dopo un breve periodo di trattamento non nota un miglioramento, consulti il medico.

Consulti il medico anche se il disturbo si presenta ripetutamente o se nota un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Se usa più CORSODYL di quanto deve

L'ingestione di CORSODYL, anche in quantità elevate, non dovrebbe produrre effetti sistemici: tuttavia se ha usato o accidentalmente ingerito una dose eccessiva di CORSODYL, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Gli effetti indesiderati rilevati sono generalmente lievi e localizzati.

Dati da studi clinici

Effetti indesiderati molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10):

lingua patinata.

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10):

bocca secca, perdita/alterazione del gusto, dolore alla lingua, sensazione di intorpidimento/diminuzione della sensibilità del cavo orale.

Dati post-marketing

Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

gravi reazioni allergiche (inclusa anafilassi), che si manifestano con eruzione cutanea, rigonfiamento di labbra, lingua, gola o viso, o di difficoltà di respirazione (vedere il paragrafo 2 "Avvertenze e precauzioni"). Se questi effetti indesiderati si verificano interrompa il trattamento e contatti immediatamente il medico.

Colorazione superficiale della lingua e dei denti (vedere il paragrafo 2 "Avvertenze e precauzioni"), dolore/irritazione della bocca, desquamazione/dolore/gonfiore della mucosa orale (vedere il paragrafo 2 "Avvertenze e precauzioni"), rigonfiamento delle ghiandole localizzate dietro la mandibola (ghiandole parotidiche).

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare CORSODYL

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sul tubo e sulla scatola dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non usi questo medicinale se nota che la membrana che sigilla l'apertura del tubo di CORSODYL non è integra.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene CORSODYL

- Il principio attivo è la clorexidina gluconato. 1 g di gel contiene 10 mg di clorexidina gluconato.
- Gli altri componenti sono: **poliossietilene-olio di ricino idrogenato**, idrossipropilcellulosa, sodio acetato, mentolo, **essenza di menta**, alcool isopropilico, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di CORSODYL e contenuto della confezione

CORSODYL è un gel dentale. Ogni confezione contiene un tubo di alluminio da 30 g.

Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.r.l. – Via Zambelletti s.n.c. – 20021 Baranzate (MI).

Produttore

FAMAR SA - 49 Km Athens – Lamia – Avlona – Grecia.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il Gennaio 2022