

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore



K2 F DIA

gocce orali soluzione

Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale omeopatico perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio e come il medico o il farmacista le ha detto di fare

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al medico o al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, inclusi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è K2 F DIA
2. Cosa deve sapere prima di prendere K2 F DIA
3. Come prendere K2 F DIA
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare K2 F DIA
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Altri medicinali e K2 F DIA

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

K2 F DIA contiene 30 vol % etanolo (alcol).

0,14 mL di prodotto equivalgono a 5 gocce (0,14 mL=5 gocce) e contengono 33,6 mg di etanolo.

Questo medicinale contiene 240 mg di alcol (etanolo) in ogni mL. La quantità in 1 mL di questo medicinale è equivalente a 6 mL di birra o 2,4 mL di vino.

L'alcol contenuto in questo medicinale omeopatico potrebbe avere influenza sui bambini. Questi effetti possono includere il sentirsi assonnati e sbalzi di umore. Può anche alterare la capacità di concentrazione e di fare attività fisica. La quantità di alcol in questo medicinale può alterare la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Questo perché l'alcol può alterare la capacità di giudizio e quanto velocemente si reagisce agli stimoli. Se è affetto da epilessia o ha problemi di fegato, parli con il medico o il farmacista prima di assumere questo medicinale. L'alcol in questo medicinale può alterare gli effetti di altri medicinali. Parli con il medico o il farmacista se sta assumendo altri medicinali. Se è incinta o sta allattando al seno,

1. Cos'è K2 F DIA

K2 F DIA è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate.

Per maggiori informazioni, rivolgersi al medico o al farmacista.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni.

2. Cosa deve sapere prima di prendere K2 F DIA

Non prenda K2 F DIA

- se è allergico ad uno qualsiasi dei componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere K2 F DIA

Consultare il medico se i sintomi persistono.

parli con il medico o il farmacista prima di assumere questo medicinale. Se ha una dipendenza da alcol, parli con il medico prima di assumere questo medicinale.

3. Come prendere K2 F DIA


Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Uso orale. Assuma le gocce diluite in poca acqua o direttamente in bocca.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

Istruzioni per l'apertura

Per aprire il flacone spingere il tappo verso il basso e, contemporaneamente, ruotarlo in senso antiorario.



4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare K2 F DIA

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul flacone dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Il prodotto dopo apertura ha una validità di 6 mesi.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene K2 F DIA

30 mL di gocce orali, soluzione contengono: Cobaltum gluconicum D6 2,05 mL, Corpus luteum suis D6 2,05 mL, Corpus luteum suis D200 2,05 mL, Cor suis 200K 0,02 mL, Glandula thymi suis D6 1,86 mL, Glandula thyroidea suis D6 2,05 mL, Glandula pinealis suis D6 2,05 mL, Hypophysis suis D6 2,05 mL, Hypothalamus suis D6 2,05 mL, Hepar suis 200K 0,02 mL, Melatonina D11 2,05 mL, Ovarium suis D12 2,05 mL, Ovarium suis D200 1,86 mL, Pancreas suis D6 1,89 mL, Pancreas suis D30 1,89 mL, Pancreas suis 200K 0,02 mL, Pulmo suis 200K 0,02 mL, Zincum gluconicum D6 1,89 mL.

Gli altri componenti sono etanolo 96% V/V e acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di K2 F DIA e contenuto della confezione

K2 F DIA è una soluzione, contenuta in un flacone di vetro munito di contagocce.

È disponibile in flacone da 30 mL.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

GUNA S.p.a.

Via Palmanova 71

20132 Milano (MI)

Italia

Tel.: 02 280 181

email: info@guna.it

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 03/2021



Guna S.p.a.

Via Palmanova, 71
20132 - Milano (MI) - Italia
Tel.: 02 280 181

3K2FDI_A