

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Naprosyn 100 mg/gel

naprossene

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Naprosyn e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Naprosyn
3. Come usare Naprosyn
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Naprosyn
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Naprosyn e a cosa serve

Naprosyn contiene il principio attivo naprossene.

Il naprossene appartiene a una classe di medicinali chiamati antinfiammatori/antireumatici non steroidei che svolgono numerose attività, con una funzione importante nel controllo del dolore.

Naprosyn gel viene usato per il trattamento locale di:

- dolori ai muscoli (mialgie)
- dolori alla schiena (lombalgie)
- dolori al collo (torcicollo)
- infiammazione dei muscoli (fibromiositi)
- infiammazioni delle articolazioni (borsiti, tendiniti, tenosinoviti, periartriti)
- traumi (contusioni, strappi muscolari, distorsioni, ematomi, edemi e infiltrati traumatici)
- infiammazioni delle vene (flebiti)

Naprosyn gel viene usato anche come supporto di:

- terapie ortopediche
- terapie di riabilitazione

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare Naprosyn

Non usi Naprosyn

- se è allergico al naprossene o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
- se è allergico a sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico al naprossene
- se è negli ultimi 3 mesi di gravidanza.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Naprosyn:

- se sta soffrendo o ha sofferto di qualche allergia
- se è allergico a medicinali come l'aspirina (acido acetilsalicilico) o ad altri medicinali anti-infiammatori non steroidei (FANS).

Se ha delle ferite, eviti di applicare il gel.

L'uso prolungato di medicinali come Naprosyn gel può causare allergie (fenomeni di sensibilizzazione). In questo caso, sospenda immediatamente il trattamento.

Per evitare eventuali allergie, comprese quelle alla luce (fotosensibilizzazione), non si esponga alla luce solare diretta, compreso il solarium, durante il trattamento e nelle due settimane successive.

Se il medicinale viene applicato su una vasta area e per un prolungato periodo di tempo, non si può escludere la comparsa di effetti collaterali su tutto il corpo.

Altri medicinali e Naprosyn

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Naprosyn gel può potenziare l'effetto di altre terapie con anti-infiammatori assunti ad es. per bocca o per via endovenosa che si distribuiscono in tutto l'organismo (terapie sistemiche).

Gravidanza, allattamento e fertilità

Le forme orali (ad esempio compresse) di Naprosyn possono causare effetti avversi nel feto. Non è noto se lo stesso rischio si applichi a Naprosyn quando viene utilizzato sulla pelle.

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Non usi Naprosyn se è negli ultimi 3 mesi di gravidanza. Non deve usare Naprosyn nei primi 6 mesi di gravidanza, a meno che non sia chiaramente necessario e consigliato dal medico. Se ha bisogno di trattamento durante questo periodo, deve utilizzare la dose più bassa per il più breve tempo possibile.

Allattamento

Il rischio di effetti dannosi a carico del bambino non è escluso.

Pertanto, se sta allattando, il suo medico valuterà attentamente la necessità di usare Naprosyn gel.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Naprosyn gel non influenza la guida di veicoli e l'utilizzo di macchinari.

Naprosyn contiene etanolo

Questo medicinale contiene 30 g di alcol (etanolo) in 100 g di gel che è equivalente a 300 mg/g (30% w/w). Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

3. Come usare Naprosyn

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Spalmi Naprosyn gel, nella zona dove ha dolore, 2 volte al giorno massaggiando leggermente fino a completo assorbimento.

Se usa più Naprosyn di quanto deve

Non sono noti casi di utilizzo di dosi eccessive. Se usa accidentalmente una dose eccessiva di Naprosyn gel avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di usare Naprosyn

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Gli effetti indesiderati che possono verificarsi con l'uso di Naprosyn gel sono:

- arrossamento della pelle (eritema)
- infiammazione della pelle (dermatite da contatto)
- prurito
- irritazione cutanea
- sensazione di calore o bruciore
- eruzioni bollose di varia gravità
- possibili reazioni anomale ed esagerate della pelle alla luce (fotosensibilità).

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti da applicare sulla pelle può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione (allergia a uno o più componenti). In tal caso interrompa il trattamento e contatti il medico che provvederà ad adottare una terapia adeguata.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Naprosyn

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Naprosyn

- Il principio attivo è naprossene. 1 grammo di gel contiene 100 milligrammi di naprossene.
- Gli altri componenti sono: carbomer, etanolo, trietanolamina, sodio metabisolfito, profumo di rosa, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Naprosyn e contenuto della confezione

Naprosyn gel è disponibile nella confezione da 1 tubo da 50 grammi di gel al 10%.

NAPROSYN

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. – Via Matteo Civitali, 1 – 20148 Milano.

Produttore

VAMFARMA S.r.l. – Via Kennedy, 5 – 26833 Comazzo (LO).

DOPPEL FARMACEUTICI S.r.l. - Via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC).

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 11/2024