

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

### Lamisil 1% crema terbinafina cloridrato

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Cos'è Lamisil e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Lamisil
3. Come usare Lamisil
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Lamisil
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Cos'è Lamisil e a cosa serve**

Lamisil contiene il principio attivo terbinafina che appartiene a un gruppo di medicinali denominati “antifungini ad ampio spettro”. Lamisil è usato per trattare le infezioni da funghi e agisce su un ampio numero di funghi.

Lamisil è indicato per il trattamento di:

- infezioni della pelle, delle unghie, cuoio capelluto ecc. causate da funghi detti “dermatofiti”
- infezioni della pelle causate da lieviti come la Candida
- Pitiriasi versicolor, un’infezione superficiale della pelle nota anche come “tinea versicolor”.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare Lamisil**

##### **Non usi Lamisil**

- se è allergico alla terbinafina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
- se è incinta o sta allattando (vedere paragrafo “Gravidanza e allattamento”)
- se il paziente è un bambino di età inferiore ai 12 anni.

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Lamisil.

Faccia particolare attenzione:

- Non ingerisca Lamisil, perché è esclusivamente per uso esterno
- Non applichi la crema vicino agli occhi, perché può essere irritante. In caso di contatto risciacqui accuratamente gli occhi con acqua corrente.

##### **Bambini**

Lamisil non deve essere usato nei bambini di età inferiore ai 12 anni.

### **Altri medicinali e Lamisil**

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Ad oggi, non sono note interazioni con altri medicinali quando terbinafina è usata localmente sulla pelle.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

#### Gravidanza

Non vi è esperienza clinica con la terbinafina in donne in stato di gravidanza. Se è incinta il medico le prescriverà Lamisil solo in caso di effettiva necessità.

#### Allattamento

Non usi Lamisil durante l'allattamento poiché la terbinafina passa nel latte materno. Inoltre fai attenzione che il neonato non venga in contatto con le aree della pelle trattate con il medicinale, incluso il seno.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Lamisil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

### **Lamisil contiene alcol cetilico, alcol stearilico**

Alcol cetilico e alcol stearilico possono causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto).

### **Lamisil contiene alcol benzilico**

Questo medicinale contiene 1 g/100 g di alcol benzilico.

Alcol benzilico può causare reazioni allergiche e lieve irritazione locale.

## **3. Come usare Lamisil**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Lamisil può essere applicato sulla pelle una o due volte al giorno, in base all'indicazione per cui è usato. Il medico le dirà quante volte deve applicare Lamisil.

- Pulisca e asciughi con cura le zone infette prima di applicare la crema
- applichi uno strato sottile di crema sulla zona infetta e sull'area vicina e massaggi delicatamente
- se le infezioni si trovano nelle pieghe della pelle (ad es. sotto il seno, tra le dita, tra i glutei o a livello dell'inguine) può proteggere la zona interessata con una garza, in particolare durante la notte.

### **Uso negli adulti**

#### Trattamento della Tinea corporis, cruris

Applichi Lamisil 1 volta al giorno per 1 settimana.

#### Trattamento della Tinea pedis (infezione che si presenta tra le dita)

Applichi Lamisil 1 volta al giorno per 1 settimana.

#### Trattamento della candidiasi della pelle

Applichi Lamisil 1 o 2 volte al giorno per 1 settimana.

#### Trattamento della Pitiriasi versicolor

Applichi Lamisil 1 o 2 volte al giorno per 2 settimane.

Dopo pochi giorni si osserva già un miglioramento della malattia. L'uso irregolare o l'interruzione prematura del trattamento può comportare il rischio di ricadute.

Nei casi particolarmente gravi il medico potrà decidere di farle proseguire la terapia.

Contatti il medico se dopo due settimane di trattamento non nota miglioramenti.

#### **Uso nei bambini**

Lamisil non deve essere usato nei bambini di età inferiore ai 12 anni.

#### **Se usa più Lamisil di quanto deve**

In caso di ingestione accidentale o uso di una dose eccessiva di Lamisil avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Dopo l'applicazione sulla pelle, la quantità di terbinafina che raggiunge il sangue è molto bassa quindi è improbabile che si verifichi un sovradosaggio. In caso di ingestione accidentale di una dose di terbinafina cloridrato superiore a 300 mg si possono verificare i seguenti effetti indesiderati:

- mal di testa
- nausea
- dolore allo stomaco
- capogiri.

Il medico tratterà l'ingestione accidentale o l'uso di una dose eccessiva di Lamisil in base alla sua condizione.

#### **Se dimentica di usare Lamisil**

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

#### **Se interrompe il trattamento con Lamisil**

Non interrompa Lamisil in modo brusco perché la malattia si potrebbe ripresentare.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

#### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

##### **Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10)**

- desquamazione della pelle
- prurito

##### **Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100)**

- lesioni della pelle
- croste
- alterazione della pelle
- macchie sulla pelle
- eritema
- sensazione di bruciore
- dolore
- dolore e irritazione sull'area di applicazione

##### **Effetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 persona su 1.000)**

- irritazione agli occhi
- secchezza della pelle
- reazioni della pelle caratterizzate ad es. da rossore, prurito e comparsa di vescicole (dermatite da contatto ed eczema)
- aggravamento dell'infezione

**Effetti indesiderati non noti (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)**

- eruzione sulla pelle (rash)
- ipersensibilità

Le reazioni allergiche si verificano raramente ma in questi casi deve interrompere il trattamento con Lamisil.

**Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

**5. Come conservare Lamisil**

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scade il". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

**6. Contenuto della confezione e altre informazioni****Cosa contiene Lamisil**

- Il principio attivo è terbinafina cloridrato. Un grammo di crema contiene 10 mg di terbinafina cloridrato equivalenti a 8,8 mg di terbinafina base.
- Gli altri componenti sono sodio idrossido, alcool benzilico, sorbitano monostearato, cetil palmitato, alcool cetilico, alcool stearilico, polisorbato 60, isopropil miristato, acqua demineralizzata.

**Descrizione dell'aspetto di Lamisil e contenuto della confezione**

Ogni confezione di Lamisil 1% crema contiene un tubo da 20 g di crema 1%.

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

Novartis Farma S.p.A.  
Largo Umberto Boccioni 1  
21040 Origgio VA  
Italia

**Produttore**

Novartis Farma S.p.A.  
Largo Umberto Boccioni 1  
21040 Origgio VA  
Italia

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 12/2021**