

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO PER:

Nemex® pasta per cani

- NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI**

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio:

Zoetis Italia S.r.l.

Via Andrea Doria, 41 M

00192 Roma

Titolare dell’autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat, 1

1348 Louvain-la-Neuve (Belgio)

- DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

NEMEX 21,62 mg/g pasta per uso orale per cani

pyrantel pamoato

- INDICAZIONE DEL(I)PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

Ogni grammo di pasta contiene:

Principio attivo:

Pyrantel pamoato 21,62 mg (pari a 7,5 mg di pyrantel base).

Eccipienti: propile-paraidrossibenzoato, metile-paraidrossibenzoato.

Pasta per uso orale, di colore da giallo a bruno giallastro.

- INDICAZIONE(I)**

Nemex pasta per cani è indicato per la terapia e la prevenzione delle infestazioni da ascaridi ed ancilostomi in cuccioli e cani adulti.

- CONTROINDICAZIONI**

Non usare in casi di ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti.

- REAZIONI AVVERSE**

Nessuna conosciuta.

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario.

In alternativa, segnalare tramite il sistema nazionale di farmacovigilanza veterinaria

(http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=FMV&idSrv=PSK&flag=P).

- SPECIE DI DESTINAZIONE**

Cani

- POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE**

Nemex va somministrato in un'unica volta senza tenere a digiuno il cane e senza far rispettare ad esso una particolare dieta.

L'appetibilità di Nemex permette di spalmare il preparato sui denti dell'animale con un dito o con una spatola per uso laringoiatrico. Mani esperte possono somministrare Nemex strisciando direttamente il tubo sui denti dell'animale. In caso di animali poco socievoli o irrequieti Nemex può essere somministrato mescolato al cibo.

Dose: 14,5 mg di pyrantel pamoato pari a 5 mg di pyrantel base per kg di peso corporeo del cane.

Modalità di somministrazione: per praticità di impiego, secondo la confezione utilizzata, si consiglia la seguente posologia:

Siringa da 16 g: una tacca della siringa ogni 2 kg di peso del cane. Il contenuto di una siringa da 16 grammi è sufficiente per il trattamento di cani del peso massimo di 24 kg.

Tubo da 10 g e 24 g: 2 cm di pasta (pari a 14,5 mg di pyrantel pamoato) per ogni kg di peso del cane. Il contenuto di un tubo da 10 grammi è quindi sufficiente per il trattamento di cani del peso massimo di 15 kg; il contenuto di un tubo da 24 grammi è sufficiente per il trattamento di cani del peso massimo di 36 kg.

Profilassi:

la profilassi si effettua per mantenere il cane libero da vermi ed evitare i rischi di infestazione per l’uomo (in particolare per il bambino) ad opera di cani affetti da verminosi.

Inoltre il trattamento profilattico con Nemex permette che il cane:

- Sia più resistente alle altre malattie;
- Sopporti maggiormente la fatica con conseguente possibilità di migliori performances;
- Presenti un sensorio più vigile;
- Sia di aspetto generale migliore, in particolare presenti pelo più lucido.

Programma di profilassi:

- Cuccioli: un trattamento all’età di 10–14 giorni, da ripetersi tra la 4ª e l'8ª settimana di età. Si ricordi in particolare la primaria importanza del trattamento pre-vaccinale poiché la presenza di parassiti è in grado di interferire con l’instaurarsi di una solida immunità vaccinale.
- Femmine: un trattamento 15 giorni prima dell'accoppiamento; un secondo trattamento una settimana prima del parto; un terzo trattamento 4 settimane dopo il parto. Questa serie di interventi tende ad evitare l’infestazione dei cuccioli durante la gravidanza e successivamente, dopo il parto, attraverso il colostro ed il latte succhiato dalla madre durante i primi giorni di vita.
- Cani da concorso: un trattamento 15–20 giorni prima del concorso.
- Cani da caccia: un trattamento 15–20 giorni prima della stagione venatoria.
- Tutti gli altri cani: un trattamento all’inizio della primavera, da ripetersi all’inizio dell’autunno.

Terapia delle infestazioni da ascaridi ed ancilostomi:

il trattamento va effettuato immediatamente ogni volta venga accertata la presenza di parassiti e ripetuto a distanza di 2–3 settimane.

- AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

Nemex va somministrato in un'unica volta senza tenere a digiuno il cane e senza far rispettare ad esso una particolare dieta.

L'appetibilità di Nemex permette di spalmare il preparato sui denti dell'animale con un dito o con una spatola per uso laringoiatrico.

Mani esperte possono somministrare Nemex strisciando direttamente il tubo sui denti dell'animale. In caso di animali

poco socievoli o irrequieti Nemex può essere somministrato mescolato al cibo.



- TEMPO DI ATTESA**

Non pertinente.

- PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: usare immediatamente.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sulla scatola di cartone dopo “SCAD.”. La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno del mese.

- AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)**

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione: In caso di difficoltà di dosaggio, per esempio quando si è impossibilitati a pesare il cane, si deve arrotondare per eccesso la dose di Nemex da somministrare. Il preparato, infatti, al di sotto del dosaggio indicato non esplica appieno tutta la sua efficacia terapeutica; al contrario, dosi elevate non presentano controindicazioni.

Può svilupparsi resistenza dei parassiti a qualsiasi classe di antelmintici dopo un uso frequente e ripetuto di un antelmintico di quella classe.

Al fine di ottenere un efficace controllo dei parassiti, il trattamento dovrebbe essere effettuato in base agli esiti dell’esame parassitologico delle feci.

Precauzioni speciali per l’impiego negli animali: nessuna. Nemex presenta un ampio margine di sicurezza e può essere tranquillamente somministrato a soggetti di tutte le età, in qualsiasi stato fisiologico (incluso femmine in gravidanza e allattamento) ed in qualsiasi stato e gravità di malattia.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali: Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Lavare con acqua la pelle in contatto con il prodotto.

Usare guanti in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti.

Gravidanza e allattamento: Il prodotto è specificatamente indicato per l’utilizzo in gravidanza e durante l’allattamento. Nel corso di prove cliniche che hanno utilizzato dosaggi più elevati rispetto a quelli raccomandati non sono stati riscontrati o segnalati effetti collaterali.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d’interazione: Non usare contemporaneamente con altri colinergici o inibitori della colinesterasi. La piperazina antagonizza l’effetto del pyrantel.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, antidoti): Il prodotto possiede un eccellente profilo di sicurezza ed un eventuale sovradosaggio non è in grado di produrre alcuna reazione avversa sia nei cuccioli sia nelle femmine in gravidanza o allattamento sia nei cani adulti. Nemex anche se somministrato in dosi 40 volte superiori a quella terapeutica e per parecchi giorni non presenta sintomi di intolleranza (vomito, perdita di peso).

Incompatibilità: non note.

- PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI**

Chiedere al tuo medico veterinario o al farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l’ambiente.

- DATA DELL’ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

Novembre 2018

- ALTRE INFORMAZIONI**

Confezioni:

Tubo da 10 g: AIC n. 100085024

Tubo da 24 g: AIC n. 100085036

Siringa da 16 g: AIC n. 100085012

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Proprietà farmacodinamiche

Il pyrantel pamoato è un composto antelmintico appartenente alla classe delle tetraidropirimidine. Possiede un ampio spettro di attività nei confronti dei principali nematodi gastrointestinali degli animali e dell'uomo.

Nella formulazione per cani si è dimostrato efficace contro i seguenti parassiti presenti nel tratto gastrointestinale di cani adulti e cuccioli: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala* e *Ancylostoma* spp.

Il meccanismo d’azione del pyrantel si basa su un potente antagonismo a livello dei recettori dell’acetilcolina (Ach) presenti sulle cellule muscolari dei nematodi che induce un blocco neuromuscolare tipico degli agenti depolarizzanti. Ne risulta una paralisi spastica del parassita che viene espulso dall’intestino dell’ospite.

Informazioni farmacocinetiche

Il pyrantel pamoato è un sale relativamente insolubile e scarsamente assorbito dall’intestino. La sua attività è limitata ai parassiti presenti nel tratto intestinale. La piccola quantità di pyrantel assorbita dal circolo ematico viene rapidamente metabolizzata, i metaboliti derivanti non hanno potenzialità tossiche.

Altre informazioni

Nemex permette per il suo spettro di efficacia antelmintica di intervenire nel cane non solo per la terapia delle parassitosi ma anche per la loro profilassi. Aggiungasi che la profilassi permette anche di evitare all'uomo, che con il cane convive, di evitare rischi di sorta.

Ricordiamo che gli animali d’affezione, e soprattutto il cane, vengono frequentemente colpiti da malattie parassitarie le quali, oltre che comportare un danno diretto al cane, sovente comportano un rischio per l’uomo che con questa specie convive. Le ascariidiosi e le ancilostomiasi rientrano in questo contesto causando nel cane enteriti, dimagrimento, dermatiti, fenomeni nervosi ecc. L'uomo invece, ed in particolare il bambino, che entra in contatto con le larve di ascaridi presenti nell’ambiente di vita del cane può contrarre l’infestazione tipica degli ospiti accidentali.

Le larve del parassita, una volta ingerite dall'uomo, non evolvono a parassita adulto ma si localizzano a volte in distretti aberranti con formazione di granulomi. Di particolare gravità risulta il granuloma della retina e dei tessuti adiacenti che può portare a cecità l’occhio colpito.