

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Connettivina 2 mg/g gel Acido ialuronico sale sodico

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Conngettivina e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Conngettivina
3. Come usare Conngettivina
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Conngettivina
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Conngettivina e a che cosa serve

Conngettivina 2 mg/g gel contiene il principio attivo acido ialuronico sale sodico, sostanza naturalmente prodotta dal nostro organismo. L'apporto locale di acido ialuronico facilita il processo di cicatrizzazione delle lesioni.

Conngettivina 2 mg/g gel è un medicinale per uso locale (topico) indicato per il trattamento di:

- abrasioni, escoriazioni, ferite superficiali, scottature, ustioni di lieve entità e piccoli tagli, , compresi quelli che possono interessare sia il capezzolo che l'areola mammaria, ovvero la zona cutanea che lo circonda (ragadi al seno);
- irritazioni localizzate della pelle causate da sole, freddo, vento, degli arrossamenti da pannolino, delle irritazioni e della disidratazione della pelle consequenti a radioterapia (terapia medica che utilizza radiazioni ad alta energia per distruggere le cellule tumorali);

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni.

2. Cosa deve sapere prima di usare Conngettivina

Non usi Conngettivina:

se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Conngettivina.
Conngettivina è solo per uso esterno.

L'utilizzo di Conngettivina, specie se prolungato, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione (reazioni allergiche). Se ciò dovesse verificarsi, interrompa il trattamento e consulti il medico che le prescriverà una terapia idonea.

Altri medicinali e Connattività

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non usi Connattività contemporaneamente con disinfettanti contenenti sali di ammonio quaternario.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Connattività può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Connattività non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

Connattività 2 mg/g gel contiene metil p-idrossibenzoato e propil p-idrossibenzoato che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

3. Come usare Connattività

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Prima di applicare Connattività, deterga e disinfetti con attenzione la parte di pelle da trattare

Applichi Connattività 2 mg/g gel 2 o 3 volte al giorno, nella quantità sufficiente a ricoprire la zona di pelle interessata. Spalmi uno strato uniforme di gel. Dopo aver applicato la medicazione coprire, eventualmente, con apposito bendaggio.

Utilizzi Connattività solo per brevi periodi di trattamento. Non superi la dose indicata.

Consulti il medico se i sintomi persistono dopo un breve periodo di trattamento o, in qualsiasi momento, se peggiorano.

Se usa più Connattività di quanto deve

In caso di utilizzo accidentale di una dose eccessiva di Connattività avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Non sono mai stati segnalati episodi di intossicazione dovuti all'utilizzo di una quantità eccessiva di Connattività.

Se dimentica di usare Connattività

Se ha dimenticato di applicare il gel, lo faccia appena se ne ricorda. Quindi continui l'applicazione secondo lo schema usuale.

Se interrompe il trattamento con Connattività

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, anche questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Sono state osservate reazioni locali, anche di tipo allergico.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <http://www.agenziafarmaco.it/it/responsabili>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Connattività

Conservi il medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

La data di scadenza indicata si riferisce al medicinale in confezionamento integro, correttamente conservato.
Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Connattività

- Il principio attivo è acido ialuronico sale sodico.
1 g di gel contiene 2 mg di acido ialuronico sale sodico. Ogni tubo da 30 g di gel contiene 60 mg di acido ialuronico.
- Gli altri componenti sono: sorbitolo 70% non cristallizzabile, **metil p-idrossibenzoato, propil p-idrossibenzoato**, Carbomer, sodio idrossido, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Connattività e contenuto della confezione

Connattività è un gel trasparente dispensato in un tubo di alluminio da 30 g.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (PD)

Produttore

Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (PD)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: 09/2020