

VICTORIA



KRUISING	Agria x Rop j 861
VROEGRIJPHEID	Halfvroeg
KNOL	Ovaal tot lang-ovaal, schilkleur : geel - vleeskleur : geel
LOOFONTWIKKELING	Het loof is niet al te stevig maar heeft een goede bodembedekking
RENDEMENT	Goed
DROGESTOFGEHALTE	21 % - 389 OWG
BESTEMMING	Verse consumptie - Thuisfriet - Kooktype B

GEVOELIGHEDEN

PHYTOPHTORA	Phytophtora loof	Gevoelig		Phytophtora knol	Weinig gevoelig	
SCHURFT	Gevoelig					
AARDAPPELMOEHEID	Type	Ro1	Ro 2/3	Pa 2	Pa 3	1 : Zeer gevoelig 9 : Niet gevoelig
	Waarde	8	1	1	1	
ALTERNARIA	Niet gevoelig					
SENCORGEVOELIGHEID	Gevoelig					
GOED OM WETEN !	Het gebruik van Metribuzine vóór opkomst moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren gezien de gevoeligheid van het ras, indien na opkomst behandeld wordt moeten lage dosissen gebruikt worden maar ook dit met de nodige voorzichtigheid. Victoria is tamelijk resistent voor kringerigheid.					



TEELTADVIES

VOORBEHANDELING POOTGOED & TEELT

Behandel steeds het pootgoed tegen rhizoctonia en zilverschurft. Voorkom condensatie om versmering te voorkomen. Bij vloeibare behandeling is het belangrijk het pootgoed goed te laten drogen. Victoria heeft een goede kiemrust, laat daarom het pootgoed voor het poten goed acclimatiseren. Victoria is geschikt voor alle grondsoorten. Planten in het witte puntjes stadium geeft de beste resultaten. Groeit verspreid in de rug. Normale opkomst.

BEMESTING

Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse. N-gift: 100% in vergelijking tot andere middenlate rassen (indicatie: 250 kg N inclusief de bodemvoorraad). Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting. De eerste overbemesting van stikstof direct na de knolzetting toedienen. Chloorkali (KCl) niet korter dan 6 weken voor het planten toepassen, late toediening kan een lager drogestofgehalte veroorzaken. Kalium- en Fosfaatbemesting volgens standaardadvies. Een verse kaligift wordt aangeraden om blauw te voorkomen.

PLANTAFSTANDEN

Maat	Planten/ha	Plantafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	26-28	21-23
35/50	38.000	34-36	28-30

Plantdiepte :
normaal,
maaielvelddiepte

LOOFDODING & OOGST

De dunne schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst. Victoria is gemiddeld gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.

BEWARING

Victoria heeft een lange kiemrust en is goed te bewaren. Wondhelingsperiode in acht nemen. Bewaren bij een stabiele temperatuur van 8°C. Ventileer regelmatig maar kort om CO₂ ophoping te voorkomen. Voor langdurige opslag moet gebruik worden gemaakt van kiemremmersmiddelen.