

## ASTERIX



KRUISING	Cardinal x VE70-9
VROEGRIJPHEID	Laat
KNOL	Ovaal, schilkleur : rood - vleeskleur : lichtgeel
LOOFONTWIKKELING	Loofontwikkeling is goed – Sterk gewas
RENDEMENT	Hoog
DROGESTOFGEHALTE	23-24 % - 437 OWG
BESTEMMING	Friet - Kooktype C

### GEVOELIGHEDEN

PHYTOPHTORA	Phytophthora loof	Gevoelig	Phytophthora knol	Gevoelig		
SCHURFT	Weinig gevoelig					
AARDAPPELMOEHEID	Type	Ro1	Ro 2/3	Pa 2	Pa 3	1 : Zeer gevoelig 9 : Niet gevoelig
	Waarde	9	1	2	1	
ALTERNARIA	Niet gevoelig					
SENCORGEVOELIGHEID	Gevoelig					
GOED OM WETEN !	Asterix is tamelijk resistent voor kringerigheid. Het gebruik van Metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Indien na-opkomst toepassing; gebruik het lage dosering systeem. Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof en knol.					



### TEELTADVIES

#### VOORBEHANDELING Pootgoed & TEELT

Behandel steeds het pootgoed tegen rhizoctonia en zilverschurft. Voorkom condensatie om versmering te voorkomen. Bij vloeibare behandeling is het belangrijk het pootgoed goed te laten drogen. Asterix heeft een normale kiemrust. Voorkiemen helpt het gewas vroeger te maken. Asterix is geschikt voor alle grondsoorten. Wanneer geplant wordt op zware kleigrond, is een goede structuur cruciaal. Kan worden geplant in het witte puntjes stadium. Voorkiemen kan de teelt vervroegen. Asterix heeft een goede droogteresistentie.

#### BEMESTING

Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse. N-gift: 80% in vergelijking tot andere late rassen door de goede loofontwikkeling. Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting. Op kali-arme gronden chloorhoudende kali (KCl) net voor het planten toedienen om stootblauw te voorkomen. Om een hoog drogestofgehalte te vermijden, is een extra toepassing van kalium nodig na de knolzetting. Fosfaatbemesting volgens standaard advies. Let op de hoeveelheid organische meststof om late mineralisatie te voorkomen.

#### PLANTAFSTANDEN

Maat	Planten/ha	Plantafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30-32	25-27
35/50	34.000	38-40	32-34

Plantdiepte :  
3 cm onder  
het maaievel

#### LOOFDODING & OOGST

Zorg voor een afgerijpt gewas en voldoende afgeharde knollen tijdens oogst. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging om stootblauw te voorkomen. Oogst Asterix met de nodige voorzichtigheid. Bij een hoge OWG neemt de kans op blauwgevoeligheid toe.

#### BEWARING

Geschikt voor bewaring tot december-januari. Bewaren bij een stabiele temperatuur van 8°C. Ventileer regelmatig maar kort om CO<sub>2</sub> ophoping te voorkomen. Asterix is gevoelig voor schilbrand. Zorg voor een goede afharding voordat je een kiemremmer toepast. Gebruik de hoogste dosis kiemremmer bij de eerste behandeling.