

## ASTERIX



CROISEMENT	Cardinal x VE70-9
PRÉCOCITÉ	Tardive
TUBERCULE	Ovale allongé, peau rouge, chair jaune pâle
PLANTE	Bon développement du feuillage, feuillage robuste
RENDEMENT	Élevé
MATIÈRE SÈCHE	23-24 % - 437 PSE
DESTINATION	Frites - Catégorie C

### SENSIBILITÉS

MILDIU	Mildiou du feuillage	Sensible	Mildiou du tubercule	Sensible		
GALLE	Peu sensible					
NÉMATODES	Type	Ro1	Ro 2/3	Pa 2	Pa 3	1 : Très sensible 9 : Pas sensible
	Valeur	9	1	2	1	
ALTERNARIA	Pas sensible					
MÉTRIBUZINE	Sensible					
BON À SAVOIR !	Asterix est relativement peu sensible aux nécroses annulaires. L'utilisation de métribuzine est recommandée en pré-levée. En cas de traitement postlevée, nous recommandons l'application de faibles doses. Utilisez un programme haut de gamme de protection contre le mildiou, en raison de sa sensibilité élevée sur feuillage et sur tubercules.					



### ITINÉRAIRE TECHNIQUE

#### PRÉPARATION DU PLANT ET CULTURE

Traiter contre le rhizoctone et la galle argentée est recommandé tout en évitant un traitement sur tubercules humides et germés. Il est important de laisser réessuyer les plants après un traitement liquide. Asterix a une dormance moyenne. La prégermination aide à avoir une culture plus précoce. Asterix peut être cultivée dans tous types de sols. Si la parcelle présente des terres lourdes, il est important d'avoir une bonne structure. Peut être planté au stade points blancs, mais la pré-germination rendra la culture plus hâtive. Asterix a une bonne résistance à la sécheresse.

#### FERTILISATION

Adapter la fertilisation en fonction de l'analyse de sol. Azote (N): env. 80% des quantités normalement apportées sur une variété tardive du au feuillage fort développé. Appliquer 2/3 avant la plantation et 1/3 en couverture. Sur les sols pauvres en potassium, une application de chlorure de potasse (Kcl) juste avant la plantation permettra d'améliorer la tolérance aux coups bleus. Pour éviter des taux de matière sèche trop élevés un apport supplémentaire de chlorure de potasse après l'initiation du tubercule peut être recommandé. Fertilisation phosphorée suivant recommandations standards. Modifier l'apport d'engrais organique afin d'éviter des minéralisations trop tardives.

#### PLANTATION

Calibre	Pieds/ha	Distance de plantation	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30-32	25-27
35/50	34.000	38-40	32-34

Profondeur de plantation : 3 cm plus bas que la normale

#### DÉFANAGE / RÉCOLTE

Veillez à récolter après défanage complet de la culture et une cicatrisation complète des tubercules. Adaptez la hauteur de chute afin d'éviter toutes blessures mécaniques et formation de coups bleus. Récoltez l'Asterix avec les précautions nécessaires car le risque de chocs augmente avec un haut PSE.

#### STOCKAGE

Asterix est adaptée au stockage jusque décembre-janvier. Stocker à une température de 8°C. Ventilez régulièrement, mais brièvement, afin de prévenir l'accumulation de CO<sub>2</sub>. Asterix est sensible aux symptômes de brûlures sur la peau. Veillez à appliquer 6 à 8 semaines de séchage/ventilation avant la première application d'inhibiteurs de germination. Appliquer la plus forte dose d'inhibiteur de germination à la première application.