

MARILYN



KRUISING	Nicola x Pomfine
VROEGRIJPHEID	Halfvroeg
KNOL	Lang-ovaal, schilkleur : geel - vleeskleur : geel
LOOFONTWIKKELING	Opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling
RENDEMENT	Hoog
DROGESTOFGEHALTE	18,5 % - 355 OWG
BESTEMMING	Verse consumptie - Geschikt voor krielteelt - Kooktype A

GEVOELIGHEDEN

PHYTOPHTORA	Phytophtora loof	Gevoelig	Phytophtora knol	Gevoelig
SCHURFT	Weinig gevoelig			
AARDAPPELMOEHEID	Type	Ro1	Ro 2/3	Pa 2
	Waarde	9	4	-
ALTERNARIA	Weinig gevoelig			
SENCORGEVOELIGHEID	Weinig gevoelig			
GOED OM WETEN !	Hoog resistent tegen Yntn.			

1 : Zeer gevoelig
9 : Niet gevoelig



TEELTADVIES

VOORBEHANDELING Pootgoed & TEELT

Behandel steeds het pootgoed tegen rhizoctonia en zilverschurft. Voorkom condensatie om versmering te voorkomen. Bij vloeibare behandeling is het belangrijk het pootgoed goed te laten drogen. Marilyn heeft een goede kiemrust, laat het pootgoed voor het poten aclimatiseren.

De beste kwaliteit wordt gerealiseerd op vruchtbare en lichte grondsoorten. Vermijd gronden met een hoog risico op Poederschurft. Plant niet op zware kleigronden, om misvormde knollen te voorkomen. Planten in het witte puntjes stadium geeft de beste resultaten. Marilyn kan vroeg geplant worden, maar vermijd poten onder koude omstandigheden.

BEMESTING

Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse. De Stikstof in één keer toedienen: Stikstof (N): 60% in vergelijking tot andere halfvroeg rassen. Kalium- en Fosfaatbemesting volgens standaardadvies. Organische bemesting wordt afgeraden.

PLANTAFSTANDEN

Maat	Planten/ha	Plantafstand	
		75 cm	90 cm
35/45	52.000	25-27	20-22
45/55	42.000	31-33	25-27

Plantdiepte:
normaal,
maaivelddiepte

LOOFDODING & OOGST

Streef naar een onderwatergewicht (OWG) van 325 gram. Start ca. 3 weken voor de verwachte oogstdatum met het meten van het drogestofgehalte. Voor een optimale kiemrust moet loofddoding plaatsvinden bij een afgerijpt gewas. Gebruik een loofddodingsmiddel met een sterke werking op de stengel, om het loslaten van de knol te bevorderen. Marilyn heeft een hoog knolaantal in de kleine sortering, pas de rooiketting hier op aan. Marilyn heeft een dunne schil, besteed extra aandacht aan de huidvastheid. Houd minstens 3 weken tussen loofddoding en oogst, voor een betere huidvastheid. Kleine beschadiging bij de oogst heeft uitdroging en vroege kieming tot gevolg.

BEWARING

Marilyn heeft een goede kiemrust, luchtkoeling kan worden gebruikt voor de eerste maanden na de oogst. Vanwege de hoge percentage kleine maat, bewaring heeft extra aandacht. Voldoende ventilatie is nodig om CO₂ ophoping te voorkomen. Voor opslag langer dan 4 maanden is mechanische koeling vereist. Voorkom uitdroging; koel met een klein verschil tussen de koellucht en product temperatuur. Verlaag de temperatuur 0,5-0,7°C per dag naar een stabiele waarde, niet lager dan 4°C. Ventileer regelmatig maar kort om CO₂ ophoping te voorkomen. Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverschurft.