

MELODY



KRUISING	VE 74-45 x W 72-22-496
VROEGRIJPHEID	Halfvroeg
KNOL	Ovaal, schilkleur : geel - vleeskleur : lichtgeel tot geel
LOOFONTWIKKELING	Sterke loofontwikkeling, goed bodembedekkend
RENDEMENT	Goed
DROGESTOFGEHALTE	21 % - 390 OWG
BESTEMMING	Verse consumptie - Kooktype B

GEVOELIGHEDEN


PHYTOPHTORA	Phytophtora loof	Gevoelig	Phytophtora knol	Weinig gevoelig		
SCHURFT	Weinig gevoelig					
AARDAPPELMOEHEID	Type	Ro1	Ro 2/3	Pa 2	Pa 3	1 : Zeer gevoelig 9 : Niet gevoelig
	Waarde	9	4	5	1	
ALTERNARIA	Gevoelig					
SENCORGEVOELIGHEID	Gevoelig					
GOED OM WETEN !	Melody is gevoelig voor ABC-ziekte (TNV).					



TEELTADVIES

VOORBEHANDELING POOTGOED & TEELT

Behandel steeds het pootgoed tegen rhizoctonia en zilverschurft. Een grondbehandeling tegen rhizoctonia wordt ook aangeraden. Vermijd condensatie om versmering te voorkomen. Bij vloeibare behandeling is het belangrijk het pootgoed goed te laten drogen. Lange kiemrust, de robuuste, stressbestendige planten zorgen voor een goede en oogstzekere productie. Melody vraagt een bodem met een goede bemesting en een goede waterhuishouding. Zand -of schurftgevoelige gronden moeten vermeden worden. Telen op percelen met kool als voorvrucht wordt afgeraden.



BEMESTING

Het ras heeft een matige stikstofbehoefte van max. 200 kg per ha (incl N-min en org. Mest). Een gedeelte gift is wenselijk. Fosfaat en kali behoefte volgens analyse. Ook een splitsing van de kaligift is wenselijk. Vlak na de knolzetting vraagt het gewas veel kali.

PLANTAFSTANDEN

Maat	Planten/ha	Plantafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	28-30	23-25
35/50	40.000	34-36	29-31

Plantdiepte :
normaal
maaielvelddiepte

LOOFDODING & OOGST

Na loofvernietiging is het noodzakelijk de knollen goed af te laten harden. Melody is gemiddeld gevoelig voor rooibeschatiging en matig voor stootblauw. Loof vernietiging zal afhankelijk zijn van het moment van rooien. Voor een goede schilvorming is 2-3 weken afharden in de grond gewenst.

BEWARING

Na rooien zo snel mogelijk droog ventileren. Voorzichtig zijn met kiemremmersmiddel bij inschuren! Bewaring bij 5°C gedurende max. 8 maanden.