

TRESOR



KRUISING	Corinne x Fresco
VROEGRIJPHEID	Vroeg
KNOL	Ovaal, schilkleur : geel - vleeskleur : lichtgeel
LOOFONTWIKKELING	Gemiddelde hoogte, lichtgroen loof
RENDEMENT	Hoog
DROGESTOFGEHALTE	19-21 % - 390 OWG
BESTEMMING	Verse consumptie – Huisfriet - Puree – Kooktype B

GEVOELIGHEDEN

PHYTOPHTORA	Phytophtora loof	Gevoelig	Phytophtora knol	Weinig gevoelig		
SCHURFT	Gevoelig					
AARDAPPELMOEHEID	Type	Ro1	Ro 2/3	Pa 2	Pa 3	1 : Zeer gevoelig 9 : Niet gevoelig
	Waarde	-	-	-	-	
ALTERNARIA	Gevoelig					
SENCORGEVOELIGHEID	Gevoelig					
GOED OM WETEN !	Tresor is weinig gevoelig aan Yn-virus.					



TEELTADVIES

VOORBEHANDELING Pootgoed & TEELT

Behandel steeds het pootgoed tegen rhizoctonia en zilverschorft. Een grondbehandeling tegen rhizoctonia wordt ook aangeraden. Voorkom condensatie om versmering te vermijden. Bij vloeibare behandeling is het belangrijk het pootgoed goed te laten drogen. Om een vroege opbrengst te krijgen is voorkiemen of een warmtestoot noodzakelijk. Vaker dan 1x afspruiten wordt afgeraden. De beginontwikkeling is goed en de vervolgentwikkeling vrij goed.

BEMESTING

Stikstof (N): 200 eenheden (gefractioneerd toedienen in lichte gronden: 1/3 voor fesen/poten ,2/3 voor knolzetting, in zwaardere gronden 100% voor poten. Fosfaat (P): 80-100 eenheden. Kalium: 320-350 eenheden. Magnesium: 80-100 eenheden.

PLANTAFSTANDEN

Maat	Planten/ha	Plantafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	29-31	24-26
35/45	37.000	35-37	29-31
45/50	34.000	38-40	30-32

Plantdiepte :
1,5 cm onder
het maaievel

LOOFDODING & OOGST

Loof vernietiging zal afhankelijk zijn van het moment van rooien. Tresor wordt hoofdzakelijk afluand verwerkt. Voor een goede schilvorming is 2-3 weken afharderen in de grond gewenst.

BEWARING

Bewaring kort mogelijk bij 7°C.