

SINORA



KRUISING	Agria x AM 70-2166
VROEGRIJPHEID	Halfvroeg
KNOL	Ovaal, schilkleur : geel - vleeskleur : lichtgeel
LOOFONTWIKKELING	De begin- en vervolgentwikkeling is prima, het loof is vrij stevig en de bodembedekking is goed
RENDEMENT	Goed
DROGESTOFGEHALTE	20 % - 370 OWG
BESTEMMING	Chips - Friet - Kooktype B

GEVOELIGHEDEN

PHYTOPHTORA	Phytophthora loof	Gevoelig		Phytophthora knol	Weinig gevoelig	
SCHURFT	Gevoelig					
AARDAPPELMOEHEID	Type	Ro1	Ro 2/3	Pa 2	Pa 3	1 : Zeer gevoelig 9 : Niet gevoelig
	Waarde	9	-	4	2	
ALTERNARIA	Gevoelig					
SENCORGEVOELIGHEID	Gevoelig					
GOED OM WETEN !	De resistentie tegen X-virus, Kringrigheid en Phytophthora in de knol is prima, tegen Yn-virus, Yntn en Fusarium goed.					



TEELTADVIES

VOORBEHANDELING POOTGOED & TEELT

Behandel steeds het pootgoed tegen rhizoctonia en zilverschurft. Een grondbehandeling tegen rhizoctonia wordt ook aangeraden. Voorkom condensatie om versmering te vermijden. Bij vloeibare behandeling is het belangrijk het pootgoed goed te laten drogen. Sinora is geschikt voor de teelt op diverse grondsoorten, maar niet op schurftgevoelige. Om een voldoende vroeg gewas te krijgen dient Sinora voorgekiemd te worden of minimaal een warmtestoot.

BEMESTING

Het advies voor stikstof is 285 kg (min 1.1x de bodemvoorraad). Bij voorkeur geen organische mest i.v.m. de vroege oogst.

PLANTAFSTANDEN

Maat	Planten/ha	Plantafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	41.200	31-33	26-28
35/55	36.000	36-38	30-32

Plantdiepte :
1 cm onder
het maaievel

LOOFDODING & OOGST

Sinora is vrij gevoelig voor rooibeschadiging en stootblauw, indien mogelijk minimaal 2 weken af laten harden. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging bij hoog OWG.

BEWARING

Sinora heeft een zeer matige kiemrust en is minder geschikt voor de bewaring. De bakkwaliteit blijft wel enige tijd op niveau.