

ANOSTA



KRUISING	Ostara x Provita
VROEGRIJPHEID	Halfvroeg
KNOL	Rond tot ovaal, schilkleur : geel - vleeskleur : lichtgeel
LOOFONTWIKKELING	Het loof is matig stevig en de bodembedekking redelijk
RENDEMENT	Goed
DROGESTOFGEHALTE	20-21 % - 385 OWG
BESTEMMING	Friet - Kooktype C

GEVOELIGHEDEN

PHYTOPHTORA	Phytophtora loof		Gevoelig	Phytophtora knol		Weinig gevoelig
SCHURFT	Gevoelig					
AARDAPPELMOEHEID	Type	Ro1	Ro 2/3	Pa 2	Pa 3	1 : Zeer gevoelig 9 : Niet gevoelig
	Waarde	9	-	-	-	
ALTERNARIA	Gevoelig					
SENCORGEVOELIGHEID	Weinig gevoelig					
GOED OM WETEN !	Anosta is vatbaar voor Poederschurft en vrij vatbaar voor Fusarium en Erwinia.					



TEELTADVIES

VOORBEHANDELING POOTGOED & TEELT

Behandel steeds het pootgoed tegen rhizoctonia en zilverschurft. Een grondbehandeling tegen rhizoctonia wordt ook aangeraden. Voorkom condensatie om versmering te vermijden. Bij vloeibare behandeling is het belangrijk het pootgoed goed te laten drogen. Om een vroege opbrengst te krijgen is voorkiemen of een warmtestoot noodzakelijk. Vaker dan 1x afspruiten wordt afgeraden. Anosta niet in te koude grond poten en niet diep i.v.m. de gevoeligheid voor onderzeeër-vorming. De beginontwikkeling is goed en de vervolgonwikkeling vrij goed.

BEMESTING

Het advies voor stikstof is 220 kg per ha. Een extra Kali-gift is niet nodig.

PLANTAFSTANDEN

Maat	Planten/ha	Plantafstand	
		75 cm	90 cm
28/40	39.200	33-35	27-29
40/55	36.000	36-38	30-32

Plantdiepte :
1,5 cm onder
het maaievel

LOOFDODING & OOGST

Loof vernietiging zal afhankelijk zijn van het moment van rooien. Anosta wordt afland verwerkt. Voor een goede schilvorming is 2-3 weken afharden in de grond gewenst.

BEWARING

Meestal zal van bewaring geen sprake zijn daar de meeste aardappelen voor de vroege frites verwerkt worden.