

GOURMANDINE



CROISEMENT	Charlotte x Estima
PRÉCOCITÉ	Mi-hâtive
TUBERCULE	Ovale allongé, peau jaune, chair jaune
PLANTE	Feuillage vigoureux et bonne couverture de sol. Levée irrégulière
RENDEMENT	Élevé
MATIÈRE SÈCHE	18,5-19,5 % - 345 PSE
DESTINATION	Consommation du frais - Catégorie A

SENSIBILITÉS

MILDIU	Mildiou du feuillage		Peu sensible	Mildiou du tubercule		Peu sensible	
GALLE	Peu sensible						
NÉMATODES	Type	Ro1	Ro 2/3	Pa 2	Pa 3	1 : Très sensible 9 : Pas sensible	
	Valeur	7	6	-	-		
ALTERNARIA	Peu sensible						
MÉTRIBUZINE	Sensible						
BON À SAVOIR !	Gourmandine est resistant au virus A et a la galle verruqueuse. Peu sensible à la galle poudreuse.						



ITINÉRAIRE TECHNIQUE

PRÉPARATION DU PLANT ET CULTURE

Traiter contre le rhizoctone et la galle argentée est recommandé tout en évitant un traitement sur tubercules humides et germés. Il est important de laisser ressuyer les plants après un traitement liquide. Il est également conseillé de réaliser un traitement du sol. Le traitement en pulvérisation liquide ne doit pas être réalisé sur des plants froids, humides (condensation suite à la sortie frigo) ou germés. Il est fortement conseillé de ne pas dépasser 1 L/t de bouillie. Les plants peuvent être traités dès la réception. Vérifier que les tubercules sont secs et à température ambiante (minimum 8°C) pour éviter le risque de condensation. Entreposer les plants en palox après traitement. Si les plants doivent être conservés en frigo, attendre 3 à 4 jours avant leur entreposage. Dans le cas où les plants sont stockés en frigo à la réception, Un réchauffement préalable des plants est nécessaire. Vérifier avant le traitement, la température des tubercules au cœur des contenants (température ambiante ou 8°C minimum). Si un lot est germé (> à 2 – 3mm) réaliser un égermage avec des tubercules réchauffés (pour éviter la condensation sur un germe cassé). Laisser cicatriser 2 -3 jours et traiter. Limiter toutefois l'égermage. Dans tous les cas après un stockage frigorifique une durée de réchauffement et de réveil des plants de 15 jours est indispensable. De préférence, planter au stade point blanc.

FERTILISATION

Adaptez la fertilisation en fonction des résultats de l'analyse de sol. La fertilisation est adaptée afin de favoriser une maturation naturelle de la culture. Azote (N): 170 unités (100% de l'apport avant buttage). Phosphate (P): 80-100 unités. Potasse (K): 300-320 unités. Magnésie (Mg): 80-100 unités.

PLANTATION

Calibre	Pieds/ha	Distance de plantation	
		75 cm	90 cm
28/35	59.000	21-23	17-19
35/45	47.000	27-29	22-24

Profondeur de
plantation normale

DÉFANAGE / RÉCOLTE

Gourmandine est très peu sensible aux blessures mécaniques à l'arrachage et peu sensible aux coups bleus. Arrachage envisageable après deux semaines de formation de la peau.

STOCKAGE

Gourmandine a une très bonne dormance et est adaptée à une longue conservation (environ 5°C). Gourmandine est assez sensible aux nécroses internes. Privilégiez le gavage en cas d'application d'anti-germinatifs.