

SANTÉ



CROISEMENT	Y 66-13-636 X AM 66-42
PRÉCOCITÉ	Mi-hâtive
TUBERCULE	Ovale, peau jaune, chair jaune pâle
PLANTE	Feuillage assez vigoureux et bonne couverture du sol
RENDEMENT	Bon
MATIÈRE SÈCHE	20-21 % - 380 PSE
DESTINATION	Consommation de frais - Frites - Biologique - Catégorie B-C

SENSIBILITÉS

MILDIU	Mildiou du feuillage		Sensible	Mildiou du tubercule		Peu sensible
GALLE	Sensible					
NÉMATODES	Type	Ro1	Ro 2/3	Pa 2	Pa 3	1 : Très sensible 9 : Pas sensible
	Valeur	9	7	7	3	
ALTERNARIA	Sensible					
MÉTRIBUZINE	Sensible					
BON À SAVOIR !	Très bonne résistance aux virus Yntn, X-, A-, virus et à la galle poudreuse.					



ITINÉRAIRE TECHNIQUE

PRÉPARATION DU PLANT ET CULTURE

Traiter contre le rhizoctone et la galle argentée est recommandé tout en évitant un traitement sur tubercules humides et germés. Il est important de laisser ressuyer les plants après un traitement liquide. Pré-germer éventuellement après un dégermage ou après un premier réchauffement du plant est important pour garantir une levée rapide. Attention de ne pas dégermer plus d'une fois. Santé a une levée assez lente rattrapée par un bon développement du feuillage par la suite. S'assurer d'avoir un sol bien réchauffé avant plantation afin de viser un développement rapide. Santé peut être plantée dans la plupart des sols mais est toutefois sensible à la galle. Santé est adaptée aussi bien à la culture traditionnelle que biologique à destination de l'industrie ou de la pomme de terre ménagère.

FERTILISATION

Le conseil de fertilisation azotée est de 225kg/ha (min. 1.1x la réserve du sol)

PLANTATION

Calibre	Pieds/ha	Distance de plantation	
		75 cm	90 cm
28/35	41.000	32-34	27-29
35/55	36.000	36-38	30-32

Profondeur de
plantation normale

DÉFANAGE / RÉCOLTE

Afin d'obtenir une bonne qualité culinaire, il est important de favoriser une sénescence naturelle. Santé est peu sensible aux dégâts à l'arrachage et aux coups bleus.

STOCKAGE

Santé est le plus souvent cultivée pour une production départ champs mais de part sa dormance sa conservation est possible jusque mars à une température de 4 à 5°C. L'emploi d'inhibiteurs est uniquement conseillé sur un produit sec et avec une peau bien formée.