

TRESOR



CROISEMENT	Corinne x Fresco
PRÉCOCITÉ	Hâtive
TUBERCULE	Ovale, peau jaune, chair jaune pâle
PLANTE	Hauteur moyenne, feuillage vert clair
RENDEMENT	Élevé
MATIÈRE SÈCHE	19-21 % - 390 PSE
DESTINATION	Frites ménagères - Consommation de frais - Purée - Catégorie B

SENSIBILITÉS

MILDIU	Mildiou du feuillage	Sensible	Mildiou du tubercule	Peu sensible		
GALLE	Sensible					
NÉMATODES	Type	Ro1	Ro 2/3	Pa 2	Pa 3	1 : Très sensible 9 : Pas sensible
	Valeur	-	-	-	-	
ALTERNARIA	Sensible					
MÉTRIBUZINE	Sensible					
BON À SAVOIR !	Tresor est peu sensible au virus Yn.					



ITINÉRAIRE TECHNIQUE

PRÉPARATION DU PLANT ET CULTURE

Traiter contre le rhizoctone et la galle argentée est recommandé tout en évitant un traitement sur tubercules humides et germés. Il est important de laisser ressuyer les plants après un traitement liquide. Pour une récolte précoce, il est nécessaire de pré-germer ou de réchauffer vos plants. Eviter de dégermer plus d'une fois les plants. Le démarrage de la culture et bon et le développement foliaire est très bon.

FERTILISATION

Azote: 200 unités. Fractionnement en sol léger 2/3 avant buttage, 1/3 début tubérisation, pour autres sols 100% de l'apport avant buttage. Phosphate: 80 à 100 unités. Potasse: 320 à 350 unités. Magnésie: 80 à 100 unités.

PLANTATION

Calibre	Pieds/ha	Distance de plantation	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	29-31	24-26
35/45	37.000	35-37	29-31
45/50	34.000	38-40	30-32

Profondeur de plantation : 1,5 cm plus bas que la normale

DÉFANAGE / RÉCOLTE

La date de défanage sera déterminée en fonction de la date de récolte souhaitée. Une période d'induration de la peau de 2 à 3 semaines est généralement conseillée pour assurer une bonne formation de la peau.

STOCKAGE

Tresor est principalement travaillée directement après départ champs et n'est généralement pas stockée. Stockage possible au froid à 7°C pour une conservation de début de saison