

PREMIERE



KRUISING	Civa x Provita
VROEGRIJPHEID	Vroeg
KNOL	Rond tot ovaal, schilkleur : geel - vleeskleur : lichtgeel
LOOFONTWIKKELING	Zeer vroege opkomst, geeft voldoende stengels
RENDEMENT	Goed
DROGESTOFGEHALTE	20-21 % - 400 OWG
BESTEMMING	Friet - Verse consumptie - Kooktype B-C

GEVOELIGHEDEN

PHYTOPHTORA	Phytophthora loof	Gevoelig	Phytophthora knol	Gevoelig		
SCHURFT	Weinig gevoelig					
AARDAPPELMOEHEID	Type	Ro1	Ro 2/3	Pa 2	Pa 3	1 : Zeer gevoelig 9 : Niet gevoelig
	Waarde	9	-	-	-	
ALTERNARIA	Weinig gevoelig					
SENCORGEVOELIGHEID	Gevoelig					
GOED OM WETEN !	Resistent aan tabaksratelvirus.					



TEELTADVIES

VOORBEHANDELING Pootgoed & TEELT

Behandel steeds het pootgoed tegen rhizoctonia en zilverschorft. Een grondbehandeling tegen rhizoctonia wordt ook aangeraden. Voorkom condensatie om versmering te voorkomen. Bij vloeibare behandeling is het belangrijk het pootgoed goed te laten drogen. Premiere heeft een redelijk kiemrust en geeft voldoende stengels. Ten einde een regelmatige opkomst te stimuleren is een warmte stoot een paar weken voor planten gewenst. Alvorens te poten dient de grond voldoende warm te zijn. Dit bevordert een snelle ontwikkeling. Premiere kan op verschillende grondsoorten geteeld worden.

BEMESTING

Premiere vereist een normale tot krappe stikstofgift ten einde vroeg een hoog onderwatergewicht te krijgen. Deze is afhankelijk van de te voorvrucht. Gangbaar is om een eerste gift van 90 – 120 kg te geven op lichtere gronden. Voor Fosfaat en Kali kan men het bodemadvies volgen.

PLANTAFSTANDEN

Maat	Planten/ha	Plantafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	42.000	32-34	27-29
35/55	35.000	37-39	30-32

Plantdiepte :
normaal,
maaielddiepte

LOOFDODING & OOGST

Loof vernietiging zal afhankelijk zijn van het moment van rooien. Premiere wordt aflagd verwerkt. Voor een goede schilvorming is 2-3 weken afharden in de grond gewenst.

BEWARING

Normaal niet van toepassing. Indien bewaring van toepassing is de partij geleidelijk aan terug koelen tot 6 graad.