SERVAGRI SA
Rue de la Terre à Briques, 3
B-7501 Orcq (Tournai)

TEL (fr) : +32 69 22 74 63
TEL (nl) : +32 69 23 30 89
FAX : +32 69 22 50 40

info@servagri.be
www.servagri.be

MOZART

CROISEMENT	Redstar x Caesar
PRÉCOCITÉ	Mi-hâtive
TUBERCULE	Ovale, peau rouge, chair jaune
PLANTE	Taille moyenne, feuillage vert foncé, floraison abondante
RENDEMENT	Bon
MATIÈRE SÈCHE	20-21 % - 373 PSE
DESTINATION	Consommation de frais - Catégorie A-B

Sensibilités

Mildiou	Mildiou du feuillage	Peu sensible	Mildiou du tubercule	Peu sensible		
Galle	Pas sensible					
Nématodes	Type	Ro1	Ro 2/3	Pa 2	Pa 3	1 : Très sensible 9 : Pas sensible
	Valeur	9	1	-	-	
Alternaria	Pas sensible					
Métribuzine	Peu sensible					
Bon à savoir !	Mozart présente une bonne tolérance aux galles communes et poudreuses.					

Itinéraire technique

Préparation du plant et culture

Traiter contre le rhizoctone et la galle argentée est recommandé tout en évitant un traitement sur tubercules humides et germés. Il est important de laisser ressuyer les plants après un traitement liquide. La pré germination aide à avoir une culture plus précoce. Pour le stockage de longue durée un traitement des plants est conseillé pour diminuer la pression en gale argentée. Mozart peut être cultivée tous types de sols. Planter des plants au stade points blancs donne les meilleurs résultats. Mozart a une émergence assez lente. Dans un second temps, le feuillage se développera ensuite en une plante robuste.

Fertilisation

Adapter la fertilisation en fonction de l'analyse de sol. Ne pas apporter d'azote trop tardivement afin d'obtenir une culture arrivant naturellement à sénescence. Ne pas appliquer d'apport d'azote en couverture. Une disponibilité de l'azote trop tardive retardera la sénescence et diminuera la qualité culinaire. Azote (N): apports recommandés d'environ 60% de la base utilisée sur vos autres variétés précoces. Ne pas appliquer de chlorure de potasse (KCl) moins de 6 semaines avant la plantation, une disponibilité trop tardive en Cl pouvant induire des taux de matière sèche trop basse. Modifier l'apport d'engrais organique de faire éviter des minéralisations trop tardives.

Plantation

Calibre	Pieds/ha	Distance de plantation	
		75 cm	90 cm
28/35	42.000	31-33	26-28
35/45	37.000	35-37	29-31
45/50	33.000	38-40	32-34
50/55	30.000	43-45	36-38

Défanage / Récolte

Commencez à contrôler le niveau de matière sèche environ 3 semaines avant la date prévue de récolte. Utiliser des produits chimiques avec un fort effet sur les tiges pour favoriser le détachement des tubercules. Seule une culture arrivée à maturité donnera un produit stockable. Mozart a une peau fine, attendre que la peau soit totalement formée. Veuillez attendre au moins 3 semaines entre le défanage et la récolte afin d'avoir une peau bien formée. La peau doit être totalement formée avant la récolte. Evitez les endommagements post-récoltes pour améliorer la tenue en stockage des tubercules.

Stockage

Des pommes de terre récoltées dans de bonnes conditions peuvent être refroidies rapidement après une ventilation préalable. Afin de prévenir une trop grande déshydratation, refroidir avec une petite différence entre l'air de refroidissement et la température du produit. Diminuer la température de 0,5°C à 0,7°C par jour jusqu'à la température de stabilité (supérieure à 4°C). Ventilez régulièrement, mais brièvement, afin de prévenir l'accumulation de CO_2. Toute fluctuation de température, combinée à de la condensation, peut se traduire par une germination précoce et un risque plus élevé de gale argentée. Evitez la condensation pendant le stockage.

Les données figurant sur cette fiche de culture sont uniquement fournies à titre d'information. Servagri décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou l'actualité de ces informations. Elle décline également toute responsabilité quant aux éventuels dégâts survenus à la suite de l'utilisation des informations reprises sur la fiche de culture ou de la crédibilité qui leur a été accordée.