

MOZART



KRUISING	Redstar x Caesar
VROEGRIJPHEID	Halfvroeg
KNOL	Ovaal, schilkleur : rood - vleeskleur : geel
LOOFONTWIKKELING	Trage opkomst, later zal het loof zich ontwikkelen tot een sterk gewas
RENDEMENT	Goed
DROGESTOFGEHALTE	20-21 % - 373 OWG
BESTEMMING	Verse consumptie - Kooktype A-B

GEVOELIGHEDEN

PHYTOPHTORA	Phytophthora loof	Weinig gevoelig	Phytophthora knol	Weinig gevoelig		
SCHURFT	Niet gevoelig					
AARDAPPELMOEHEID	Type	Ro1	Ro 2/3	Pa 2	Pa 3	1 : Zeer gevoelig 9 : Niet gevoelig
	Waarde	9	1	-	-	
ALTERNARIA	Niet gevoelig					
SENCORGEVOELIGHEID	Weinig gevoelig					
GOED OM WETEN !	Goede resistentie tegen schurft en poederschurft.					



TEELTADVIES

VOORBEHANDELING Pootgoed & TEELT

Behandel steeds het pootgoed tegen rhizoctonia en zilverschurft. Voorkom condensatie om versmering te voorkomen. Bij vloeibare behandeling is het belangrijk het pootgoed goed te laten drogen. Voorkiemen helpt het gewas vroeger te maken. Voor lange bewaring worden knolbehandelingen geadviseerd om zilverschurft onder controle te houden. Mozart is geschikt voor alle grondsoorten. Planten in het witte puntjes stadium geeft de beste resultaten.

BEMESTING

Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse. Stem het tijdstip van bemesting af, om een natuurlijk gerijpt gewas te verkrijgen. De Stikstof in één keer toedienen. Een late beschikbaarheid van stikstof vertraagt de afrijping en geeft een slechte kookkwaliteit. Stikstof (N): 60% in vergelijking tot andere midden late rassen. Chloorkali (KCl) niet korter dan 6 weken voor het planten toepassen, late toediening kan een lager drogestofgehalte veroorzaken. Let op de hoeveelheid organische meststof om late mineralisatie te voorkomen.

PLANTAFSTANDEN

Maat	Planten/ha	Plantafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	42.000	31-33	26-28
35/45	37.000	35-37	29-31
45/50	33.000	38-40	32-34
50/55	30.000	43-45	36-38

Plantdiepte :
normaal

LOOFDODING & OOGST

Streef naar een Onderwatergewicht van 355 gram. Start ca. 3 weken voor de verwachte oogstdatum met het meten van het drogestofgehalte. Gebruik een loofdodingsmiddel met een sterke werking op de stengel, om het loslaten van de knol te bevorderen. Alleen een rijp gewas zal een goed bewaarproduct geven. MOZART heeft een dunne schil, besteed extra aandacht aan de huidvastheid. Houd minstens 3 weken tussen loofdoding en oogst, voor een betere huidvastheid. De dunne schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst. Voorkom mechanische beschadiging, om bewaarbaarheid te verbeteren.

BEWARING

Product gerooid onder goede omstandigheden, kan na de wondheling snel worden gekoeld. Mechanische koeling : voorkom uitdroging; koel met een klein verschil tussen de koellucht en product temperatuur. Verlaag de temperatuur 0,5-0,7°C per dag naar een stabiele waarde, niet lager dan 4°C. Ventileer regelmatig maar kort om CO₂ ophoping te voorkomen. Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverschurft.