

INNOVATOR



KRUISING	Shepody x RZ-84-2580
VROEGRIJPHEID	Halfvroeg
KNOL	Ovaal tot lang-ovaal, schilkleur : bruin - vleeskleur : lichtgeel
LOOFONTWIKKELING	Matige loofontwikkeling
RENDEMENT	Goed
DROGESTOFGEHALTE	20-21 % - 389 OWG
BESTEMMING	Friet - Kooktype B

GEVOELIGHEDEN

PHYTOPHTORA	Phytophthora loof	Gevoelig	Phytophthora knol	Weinig gevoelig		
SCHURFT	Weinig gevoelig					
AARDAPPELMOEHEID	Type	Ro1	Ro 2/3	Pa 2	Pa 3	1 : Zeer gevoelig 9 : Niet gevoelig
	Waarde	2	1	8	9	
ALTERNARIA	Gevoelig					
SENCORGEVOELIGHEID	Gevoelig					
GOED OM WETEN !	Am- resistentie tegen Pa2 & Pa3. Innovator is gevoelig voor Metribuzin, ook bij toediening voor de opkomst. Innovator is gevoelig voor Alternaria. Eerste bespuiting uitvoeren rond de bloei.					



TEELTADVIES

VOORBEHANDELING Pootgoed & TEELT

Behandel steeds het pootgoed tegen rhizoctonia en zilverschurft. Een grondbehandeling tegen rhizoctonia wordt ook aanbevolen. Voorkom condensatie om versmering te voorkomen. Bij vloeibare behandeling is het belangrijk het pootgoed goed te laten drogen. Innovator heeft een normale kiemrust. Plant niet direct vanuit de koeling, warm het pootgoed tijdig op voor planten. Innovator reageert goed op het snijden van de grote potermaat, het beste resultaat wordt verkregen bij 3-4 weken voor het planten. Plant in warme grond, niet te vroeg planten. Op lichte gronden met vrijlevende aaltjes is er een hoog risico op kringerigheid. Gebruik nematicides. Voorkiemen is niet nodig, Innovator kan worden geplant in het witte puntjes stadium. Berekening wordt geadviseerd onder droge omstandigheden.

BEMESTING

Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting. De eerste overbemesting van stikstof direct na de knolzetting toedienen. Stikstof (N): 120% in vergelijking tot andere midden vroege rassen. Chloorkali (KCl) niet minder dan 6 weken voor het planten toepassen, late toediening kan een lager drogestofgehalte veroorzaken. Een hoge beschikbaarheid van fosfaat wordt aanbevolen, om de ontwikkeling van het wortelstelsel te stimuleren. Innovator is gevoelig voor mineraaltekorten, daarom bemesten met sporenelementen. Op lichtere gronden wordt een extra boriumgift geadviseerd. Zorg ervoor dat het gewas vitaal blijft.

PLANTAFSTANDEN

Maat	Planten/ha	Plantafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	55.000	23-25	19-21
35/50	40.000	32-34	27-29

Plantdiepte :
3 cm onder
het maaieveld

LOOFDODING & OOGST

Als maleine hydrazide wordt gebruikt op Innovator, dient het toegepast te worden wanneer de kleinste knol 28 mm is en het loof nog groen is. Houd minstens 3 weken tussen loofdoding en oogst, voor een betere huidvastheid. Innovator is gemiddeld gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.

BEWARING

Wondhelingsperiode in acht nemen. Innovator is gevoelig voor interne kiemen. Gebruik geen kiemremmende middelen als de knollen zijn gekiemd. Bewaren bij een stabiele temperatuur van 7°C. Ventilair regelmatig maar kort om CO₂ ophoping te voorkomen. Innovator is gevoelig voor schilbrand. Zorg voor een goede afharding voordat je een kiemremmer toepast. Gebruik de hoogste dosis kiemremmer bij de eerste behandeling. Voor langdurige opslag moet gebruik worden gemaakt van kiemremmingsmiddelen.