


FRANCELINE



KRUISING	Nicola x Arka
VROEGRIJPHEID	Halfvroeg
KNOL	Lang-ovaal, schilkleur : rood - vleeskleur : geel
LOOFONTWIKKELING	Opkomst is gelijkmatig, met een goede sterke loofontwikkeling
RENDEMENT	Hoog
DROGESTOFGEHALTE	18-20 % - 340 OWG
BESTEMMING	Verse consumptie - Kooktype A

GEVOELIGHEDEN

PHYTOPHTORA	Phytophthora loof	Gevoelig		Phytophthora knol	Gevoelig	
SCHURFT	Weinig gevoelig					
AARDAPPELMOEHEID	Type	Ro1	Ro 2/3	Pa 2	Pa 3	1 : Zeer gevoelig 9 : Niet gevoelig
	Waarde	1	1	2	2	
ALTERNARIA	Weinig gevoelig					
SENCORGEVOELIGHEID	Weinig gevoelig					
GOED OM WETEN !	Het gebruik van Metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Indien na-opkomst toepassing; gebruik het lage dosering systeem. De weersomstandigheden hebben een grote invloed op de effectiviteit van Metribuzin, pas de dosering aan de weersomstandigheden aan.					



TEELTADVIES

VOORBEHANDELING Pootgoed & TEELT

Knol- en/of bodembehandelingen worden geadviseerd om Rhizoctonia, zilverschurft en andere bodemgebonden ziekten te beheersen. Te vroeg planten kan een hoger risico op misvormde knollen door Rhizoctonia tot gevolg hebben. Azoxystrobinetoegevoegd op de bodem zorgt voor goede resultaten op vele schimmels. Voorkom condensatie om versmering te vermijden. Bij vloeibare behandeling is het belangrijk het pootgoed goed te laten drogen. Franceline heeft een normale kiemrust. Bewaar het pootgoed in de koeling, om topspruitdominatie te voorkomen. Laat het pootgoed voor het planten acclimatiseren. Indien een topspruit aanwezig, verwijder deze en plant in het witte puntjes stadium. Franceline is geschikt voor alle grondsoorten, op kleigronden is een goede structuur noodzakelijk om misvormde knollen te voorkomen. Planten in het witte puntjes stadium geeft de beste resultaten. Beregening zorgt voor een gelijkmatiger product en een betere kookkwaliteit. Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof en knol. Gebruik later in het seizoen middelen met een goede knolbescherming. Extra aandacht voor luisbestrijding.

BEMESTING

Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse. Deelgift wordt aanbevolen, 4/5 voor het planten en 1/5 na het planten. Stem het tijdstip van bemesting af, om een natuurlijk gerijpt gewas te verkrijgen. Stikstof (N): 80% in vergelijking tot andere midden late rassen. Fosfaatbemesting volgens standaard advies. Let op de hoeveelheid organische meststof om late mineralisatie te voorkomen.

PLANTAFSTANDEN

Maat	Planten/ha	Plantafstand	
		75 cm	90 cm
28/32	55.000	29-31	24-26
32/40	44.000	32-34	27-29

Plantdiepte:
normaal,
maaiveld diepte

LOOFDODING & OOGST

Streef naar een onderwatergewicht van 325 gram. Houd minstens 3 weken tussen loofddoding en oogst, voor een betere huidvastheid. Voorkom mechanische beschadiging, om bewaarbaarheid te verbeteren.

BEWARING

Vanwege het hoge percentage kleine maat, heeft de bewaring extra aandacht nodig. Voldoende ventilatie is nodig om CO₂ ophoping te voorkomen. Korte luchtcooling is mogelijk. Zorg voor goed afgeharde knollen bij de oogst. Mechanische koeling : voorkom uitdroging; koel met een klein verschil tussen de koellucht en product temperatuur. Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, niet lager dan 5°C. Een bewaar temperatuur die lager is dan aanbevolen, resulteert in hogere suikers. Ventileer regelmatig maar kort om CO₂ ophoping te voorkomen. Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverschurft.