

MARITIEMA



CROISEMENT	AM 71 125 x VE709
PRÉCOCITÉ	Mi-hâtive
TUBERCULE	Ovale à ovale allongé, peau jaune, chair jaune pâle
PLANTE	Levée irrégulière
RENDEMENT	Élevé
MATIÈRE SÈCHE	22 % - 410 PSE
DESTINATION	Frites - Consommation du frais - Catégorie B-C

SENSIBILITÉS

MILDIU	Mildiou du feuillage	Sensible		Mildiou du tubercule	Pas sensible	
GALLE	Peu sensible					
NÉMATODES	Type	Ro1	Ro 2/3	Pa 2	Pa 3	1 : Très sensible 9 : Pas sensible
	Valeur	9	-	9	-	
ALTERNARIA	Peu sensible					
MÉTRIBUZINE	Peu sensible					
BON À SAVOIR !	Maritiema n'est pas sensible au Sencor®, uniquement d'application avant la levée.					



ITINÉRAIRE TECHNIQUE

PRÉPARATION DU PLANT ET CULTURE

Traiter contre le rhizoctone et la galle argentée est recommandé tout en évitant un traitement sur tubercules humides et germés. Il est important de laisser ressuyer les plants après un traitement liquide. Maritiema a une dormance moyenne. Afin d'obtenir une végétation régulière et plus précoce il est préférable de réchauffer les plants quelques semaines avant plantation. Il est également important de planter dans des sols réchauffés et ayant une bonne structure, cela favorisera un développement rapide. Pour un objectif de formation d'une belle peau, le meilleur résultat est obtenu en sols argileux. La formation d'une belle butte permet une croissance régulière de la végétation.

FERTILISATION

Maritiema nécessite un apport azoté normal. Habituellement il est conseillé un premier apport de 175-200kg en sols argileux et 70-90kg au moment de la tubérisation. Une analyse de sol déterminera les besoins en phosphore et potassium. Une attention particulière au niveau du chlore qui peut influencer l'assimilation de potasse utile à l'obtention d'un bon poids sous eau.

PLANTATION

Calibre	Pieds/ha	Distance de plantation	
		75 cm	90 cm
30/35	47.500	27-29	22-24
35/50	35.000	37-39	30-32

Profondeur de
plantation : 2 à 4 cm
plus profond que la
normale

DÉFANAGE / RÉCOLTE

Le défanage dépendra du segment de marché choisi. Déterminer la période de défanage en réalisant des échantillonnages à temps. Respecter un délai de 2-3 semaines entre le défanage et la récolte afin d'obtenir une peau bien formée. Attention aux blessures mécaniques à la récolte et aux risques de coups bleus en raison du relativement haut poids sous eau.

STOCKAGE

Très bonne aptitude à la conservation. Appliquer l'emploi d'inhibiteurs selon les conseils d'application, pas de sensibilité reconnue aux brûlures de peau. Après récolte, il est conseillé de ventiler et sécher le plus rapidement pour éviter le développement de galle argentée. Refroidir progressivement la marchandise jusque 6°C. En raison de sa dormance moyenne, un traitement normal CIPC-IPC peut être utilisé. Attention à l'effet négatif de brûlures de peau si la qualité « marché emballage » est recherchée. Moins problématique pour une transformation en frites.