

V10 NICORETTE® BUCOMIST e NICORETTE® BUCOMIST SABOR FRUTA MENTA 1 mg/pulverização nicotina, solução para pulverização bucal. **Indicações:** tratamento da dependência do tabaco. Indicado ≥ 18 anos. **Posologia e modo de administração:** via bucal. Cessação abrupta tabágica: Etapa 1: 1-2 pulverizações nos períodos em que fumaria um cigarro ou quando sentir vontade de fumar. Etapa 2: reduzir o nº de pulverizações e no final da 9ª semana utilizar metade do nº de pulverizações/dia da Etapa 1. Etapa 3: reduzir o nº de pulverizações e no final da 12ª semana não ultrapassar 4 pulverizações/dia. Após reduzir para 2-4 pulverizações/dia, descontinuar. Não exceder 4 pulverizações/hora, 2 pulverizações/dose e 64 pulverizações/dia. Redução gradual do tabagismo: utilizar entre os períodos de tabagismo para prolongar os intervalos sem fumo e reduzir ao máximo o tabagismo. Se não ocorrer redução no consumo de cigarros após 6 semanas de tratamento, consultar um profissional de saúde. Depois de parar de fumar, reduzir gradualmente o nº de pulverizações/dia. Não inalar durante a pulverização. Nicorette® BucoMist ou Nicorette® BucoMist Sabor Fruta Menta pode ser utilizado em associação com Nicorette Invisipatch para fumadores com elevado grau de dependência, que continuam a sentir desejos incontrolláveis de fumar ou que não tiveram sucesso com a monoterapia. **Contraindicações:** hipersensibilidade aos componentes, < 18 anos, não fumadores. **Advertências e precauções:** doenças cardiovasculares, compromisso renal/hepático, doenças gastrointestinais. **Efeitos indesejáveis:** cefaleias, soluços, garganta irritada, náusea; hipersensibilidade, parestesia, disgeusia, tosse, dor abdominal, boca seca, diarreia, dispepsia, flatulência, hipersecreção salivar, estomatite, vômitos, sensação de queimadura, fadiga; sonhos anormais, palpitações, taquicardia, rubor, hipertensão, broncospasmo, rinorreia, disfonia, dispneia, congestão nasal, dor orofaríngea, espirros, aperto na garganta, eructação, sangramento gengival, glossite, ulceração e esfoliação da mucosa oral, parestesia oral, hiperidrose, prurido, erupção cutânea, urticária, astenia, dor e desconforto no peito, mal-estar; disfagia, hipoestesia oral, esforço para vomitar; reações alérgicas (angioedema e anafilaxia), visão turva, aumento do fluxo lacrimal, fibrilhação auricular, garganta seca, desconforto gastrointestinal, dor no lábio, eritema, convulsão. MNSRM. Para mais informações contactar o titular da AIM. JNTL Consumer Health (Portugal), Lda. Lagoas Park, Edifício 11, Piso 0, 2740-270 Porto Salvo. NIPC 516808206.