

V05 **VISINE®** 0,5 mg/ml tetrizolina, colírio, solução. **Indicações:** alívio temporário da hiperemia do olho causada por irritações oculares não infeciosas, p.e., devido a fumo, poeira, vento, água clorada, luz ou conjuntivite alérgica. **Posologia e modo de administração:** Uso oftálmico. Adultos e crianças ≥ 6 anos: 1-2 gotas no(s) olho(s) afetado(s) 2-3 vezes/dia, durante o mínimo tempo necessário para aliviar os sintomas. Crianças 2-6 anos: 1 gota no(s) olho(s) afetado(s) 2-3 vezes/dia. **Contraindicações:** hipersensibilidade aos componentes, glaucoma de ângulo fechado, crianças < 2 anos. **Advertências e precauções:** não utilizar: doenças cardiovasculares graves, hiperplasia da próstata, alterações metabólicas, rinite seca, queratoconjuntivite seca e glaucoma. Evitar o uso excessivo/contínuo (para além de 3-5 dias). Interromper tratamento e consultar médico: se não ocorrer melhoria em 48 horas ou se a irritação/vermelhidão ocular persistirem/ aumentarem, dor ocular, cefaleias, perda da visão, perturbações visuais, vermelhidão ocular aguda grave ou unilateral ou dor quando exposto à luz. Remover lentes de contacto antes da utilização e recolocar 15 minutos após a administração. **Efeitos indesejáveis:** irritação ocular (dor, sensação de picadas, ardor), insuficiência visual, hiperemia reativa, ardor nas mucosas, mucosas secas; midriase; queratinização epitelial (xerose) da conjuntiva com oclusão dos pontos lacrimais e epífora (olho lacrimejante) após uso prolongado de tetrizolina, calcificação da córnea em doentes com córneas lesadas; hipersecreção lacrimal, reação no local da aplicação (incluindo ardor ocular ou periocular, eritema, irritação, edema, dor e prurido). MNSRM-EF. Para mais informações contactar o titular da AIM. JNTL Consumer Health (Portugal), Lda. Lagoas Park, Edifício 11, Piso 0, 2740-270 Porto Salvo. NIPC 516808206.