

V10 **KOMPENSAN® TRIEFFECT** 340 mg carbonato de di-hidróxido de alumínio e sódio + 30 mg dimeticone, comprimidos para chupar. **Indicações:** alívio sintomático de perturbações gastrointestinais relacionadas com acidez, acompanhadas por sintomas relacionados com a acumulação de gases no trato gastrointestinal. **Posologia e modo de administração:** 1-2 comprimidos para chupar no intervalo das refeições ou ao deitar. Dose máx/dia: 8 comprimidos para chupar. Chupar na boca, não engolir ou dissolver em água. Não utilizar ≥ 2 semanas, exceto mediante aconselhamento médico. **Contraindicações:** hipersensibilidade aos componentes; função renal diminuída ou em doentes com dieta hipossalina; hipofosfatemia; obstipação e estenose colónica conhecida. **Advertências e precauções:** interromper a utilização e consultar um médico se os sintomas persistirem/piorarem ou em caso de desenvolvimento de novos sintomas. Não recomendado em crianças < 12 anos. Precaução em doentes hemodialisados. Risco de asfixia. **Interações medicamentosas e outras:** tetraciclina, quinolonas (ciprofloxacina, ofloxacina e pefloxacina), cefalosporinas, raltegravir, dolutegravir e elvitegravir. **Efeitos indesejáveis:** reações de hipersensibilidade (prurido, urticária, aperto da garganta e dispneia), irritação da garganta, obstipação, diarreia, glossodinia, hipoestesia oral, náuseas, desconforto oral, língua inchada, sensação de ardor (manifestada como uma sensação de ardor local na boca). MNSRM. Para mais informações contactar o titular da AIM. JNTL Consumer Health (Portugal), Lda. Lagoas Park, Edifício 11, Piso 0, 2740-270 Porto Salvo. NIPC 516808206.