

V11 **IMODIUM® DUOEFFECT** 2 mg loperamida + 125 mg simeticone, comprimidos. **Indicações:** tratamento sintomático da diarreia aguda associada a desconforto abdominal causado por gases, incluindo distensão abdominal, espasmos ou flatulência. **Posologia e modo de administração:** adultos: 2 comprimidos + 1 comprimido após cada dejeção diarreica. Crianças 12-18 anos: 1 comprimido + 1 comprimido após cada dejeção diarreica. Dose máx./dia: 4 comprimidos. Duração máx. do tratamento: 2 dias. Engolir comprimidos inteiros com um copo de água. **Contraindicações:** crianças < 12 anos, hipersensibilidade aos componentes, disenteria aguda, colite ulcerosa aguda, colite pseudomembranosa associada a antibióticos de largo espectro, enterocolite bacteriana causada por organismos invasivos (incluindo *Salmonella*, *Shigella* e *Campylobacter*); para evitar a inibição do peristaltismo. Interromper se surgir obstipação, íleus ou distensão abdominal. **Advertências e precauções:** insuficiência hepática; interromper caso não ocorra melhoria em 48 horas e em doentes com SIDA aos 1^{os} sinais de distensão abdominal. **Efeitos indesejáveis:** cefaleia, disgeusia, náuseas; sonolência, tonturas, dor abdominal, desconforto abdominal, dor abdominal superior, vômito, obstipação, distensão abdominal, dispepsia, flatulência, boca seca, erupção cutânea, astenia; reação de hipersensibilidade, reação anafilática (choque anafilático), reação anafilactóide, perda de consciência, nível reduzido de consciência, estupor, hipertonia, coordenação anormal, miose, íleo (íleo paralítico), megacôlon (megacôlon tóxico), erupção bolhosa (síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica, eritema multiforme), angioedema, urticária, prurido, retenção urinária, fadiga; pancreatite aguda. MNSRM. Para mais informações contactar o titular da AIM. JNTL Consumer Health (Portugal), Lda. Lagoas Park, Edifício 11, Piso 0, 2740-270 Porto Salvo. NIPC 516808206.