

V08 **DAKTARIN**[®] 20 mg/g miconazol, creme. **Indicações:** tratamento das infeções das unhas/interdigitais provocadas por dermatófitos/leveduras/outros, como *tinea corporis*, *manuum*, *barbae*, *cruris*, *pedis* (pé de atleta) e de micoses secundariamente infetadas por bactérias Gram-positivas (p.e. dermatite das fraldas). **Posologia e modo de administração:** uso cutâneo, aplicar nas lesões 2 vezes/dia, durante 2-6 semanas, consoante a localização/gravidade da lesão. Não interromper durante pelo menos 1 semana após o desaparecimento de todos os sinais/sintomas. Massajar o creme até ser totalmente absorvido. **Contraindicações:** hipersensibilidade aos componentes e a outros derivados do imidazol. **Advertências e precauções:** interromper em caso de reação de sensibilidade/irritação. Evitar contacto com os olhos. **Efeitos indesejáveis:** reações anafiláticas, hipersensibilidade, edema angioneurótico, urticária, dermatite de contacto, erupção cutânea, eritema, prurido, sensação de queimadura, reações no local de administração, incluindo irritação localizada; inflamação, hipopigmentação, queimadura local, calor local. MNSRM. Para mais informações contactar o titular da AIM. JNTL Consumer Health (Portugal), Lda. Lagoas Park, Edifício 11, Piso 0, 2740-270 Porto Salvo. NIPC 516808206.