

V11 **MOTILIUM®** 10 mg domperidona, comprimido revestido por película. **Indicações:** alívio dos sintomas de náuseas e vômitos. Indicado  $\geq$  12 anos e peso  $\geq$  35 kg. **Posologia e modo de administração:** utilizar a dose mín. eficaz pelo período mais curto necessário. Tomar antes das refeições, via oral. Duração máx. do tratamento: 1 semana. 1 comprimido até 3 vezes/dia, no máx. 3 comprimidos/dia. **Contraindicações:** hipersensibilidade aos componentes; prolactinoma; quando a estimulação da motilidade gástrica possa ser nociva (p.ex. hemorragia gastrointestinal, obstrução mecânica ou perfuração); compromisso hepático moderado/grave; prolongamento dos intervalos de condução cardíaca, sobretudo do intervalo QTc, doentes com perturbações significativas dos eletrólitos ou doenças cardíacas subjacentes, como insuficiência cardíaca congestiva; administração concomitante com fármacos que prolongam o intervalo QT, exceto apomorfina; administração concomitante com inibidores potentes do CYP3A4 (independentemente dos efeitos de prolongamento do intervalo QT). **Advertências e precauções:** risco aumentado de arritmias ventriculares graves ou morte súbita cardíaca. Interromper e consultar médico se ocorrerem sinais/sintomas de arritmia cardíaca. **Interações medicamentosas e outras:** fármacos que inibem significativamente enzima CYP3A4; indutores de bradicardia e hipocalemia. **Efeitos indesejáveis:** xerostomia; perda da libido, ansiedade, agitação, nervosismo, tonturas, sonolência, cefaleia, afeção extrapiroamidal, diarreia, erupção cutânea, prurido, urticária, galactorreia, dor na mama, hipersensibilidade dolorosa da mama, astenia; reação anafilática (incluindo choque anafilático), convulsão, síndrome das pernas inquietas, crise oculógira, arritmias ventriculares, prolongamento QTc, Torsade de Pointes, morte cardíaca súbita, angioedema, retenção urinária, ginecomastia, amenorreia, teste da função hepática anormal, prolactinemia aumentada. MSRM comparticipado (escalão C - 37%). Para mais informações contactar o titular da AIM. JNTL Consumer Health (Portugal), Lda. Lagoas Park, Edifício 11, Piso 0, 2740-270 Porto Salvo. NIPC 516808206.